

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2002-543822

(P2002-543822A)

(43) 公表日 平成14年12月24日 (2002. 12. 24)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
C 1 2 N 15/09	Z N A	A 6 1 K 39/395	M 4 B 0 2 4
A 6 1 K 39/395			S 4 B 0 6 4
		A 6 1 P 11/00	4 B 0 6 5
		31/14	4 C 0 8 5
A 6 1 P 11/00		C 0 7 K 16/10	4 H 0 4 5
31/14			
審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 92 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2000-617922(P2000-617922)
 (86) (22) 出願日 平成12年5月18日 (2000. 5. 18)
 (85) 翻訳文提出日 平成13年11月16日 (2001. 11. 16)
 (86) 国際出願番号 P C T / U S 0 0 / 1 3 6 9 4
 (87) 国際公開番号 W O 0 0 / 6 9 4 6 2
 (87) 国際公開日 平成12年11月23日 (2000. 11. 23)
 (31) 優先権主張番号 6 0 / 1 3 4 , 7 0 2
 (32) 優先日 平成11年5月18日 (1999. 5. 18)
 (33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 スミスクライン・ビーチャム・コーポレイ
 ション
 S M I T H K L I N E B E E C H A M
 C O R P O R A T I O N
 アメリカ合衆国ペンシルベニア州19406-
 0939、キング・オブ・プルシア、スウェー
 ドランド・ロード709番
 (72) 発明者 ミッチェル・エス・グロス
 アメリカ合衆国19087ペンシルベニア州ウ
 ェイン、ビュー・ロード667番
 (74) 代理人 弁理士 青山 葆 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒトモノクローナル抗体

(57) 【要約】

本発明は、新規なヒトモノクローナル抗体 (mAb) および該モノクローナル抗体をコードしている遺伝子に関する。より詳細には、本発明は、RSウイルス (RSV) の融合 (F) 蛋白質のエピトープと特異的に反応するヒトモノクローナル抗体に関する。かかる抗体は、ヒト患者、特に幼児および幼い小さい子供におけるRSV感染の治療的および／または予防的処理に有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 RSウイルスのF蛋白質エピトープと特異的に反応し、G λ -1AおよびG λ -1Bよりなる群から選択される該ウイルスによる感染を中和できるヒトモノクローナル抗体およびその機能的フラグメント。

【請求項2】 図3 配列番号2のL鎖アミノ酸配列および図4 配列番号4のH鎖アミノ酸配列を含む請求項1記載のモノクローナル抗体。

【請求項3】 図11 配列番号16によってコードされるL鎖アミノ酸配列および図10A-10B 配列番号15のDNA配列によってコードされるH鎖アミノ酸配列を含む請求項1記載のモノクローナル抗体。

【請求項4】 フラグメントがF ν 、F $a\ b$ およびF $(a\ b')$ ₂よりなる群から選択される請求項1記載のモノクローナル抗体。

【請求項5】 (a) 請求項1～4のいずれか1項記載のヒトモノクローナル抗体、改変抗体およびCDRのいずれかをコードしている核酸配列；

(b) (a)におけるいずれかの配列に相補的な核酸；および

(c) ストリンジェントな条件下で請求項1～4のいずれか1項記載のCDRにハイブリダイズできる18以上のヌクレオチドの核酸配列よりなる群から選択される単離核酸分子。

【請求項6】 図8A-8Fおよび9A-9E 配列番号13および14、または図10A-10Bおよび11 配列番号15および16の配列を含む請求項5記載の単離核酸分子。

【請求項7】 請求項5または6のいずれか1項記載の核酸配列を含む組換えプラスミド。

【請求項8】 請求項7記載のプラスミドを含む宿主細胞。

【請求項9】 請求項8記載の宿主細胞を適当な温度およびpH条件下で培地中において培養し、そのように生産された抗体を回収することを特徴とするRSVに特異的なヒト抗体の生産法。

【請求項10】 RSVを含有する疑いのある供給源を診断上有効量の請求項1記載のモノクローナル抗体と接触させ、モノクローナル抗体が該供給源に結合するか否かを決定することを特徴とするRSVの検出法。

【請求項 1 1】 ヒトに免疫治療上有効量の請求項 1 記載のモノクローナル抗体を投与することを特徴とする、ヒトにおける R S V 疾患に受動免疫治療を提供する方法。

【請求項 1 2】 受動免疫治療が予防的に提供される請求項 1 1 記載の方法。

【請求項 1 3】 医薬上許容される担体中における免疫治療上有効量の請求項 1 記載のモノクローナル抗体の少なくとも 1 投与量を含んでなる医薬組成物。

【請求項 1 4】 免疫治療上有効量の請求項 1 記載のモノクローナル抗体の少なくとも 1 投与量を少なくとも 1 つの付加的なモノクローナル抗体と組み合わせて含んでなる医薬組成物。

【請求項 1 5】 付加的なモノクローナル抗体が R S V F 蛋白質抗原の異なるエпитープと反応性であることによって請求項 1 記載の抗体と区別される抗-R S V 抗体である請求項 1 4 記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

(技術分野)

本発明は、新規なヒトモノクローナル抗体 (mAb) および該モノクローナル抗体をコードしている遺伝子に関する。より詳細には、本発明は、RSウイルス (Respiratory Syncytial Virus) (RSV) の融合 (F) 蛋白質のエピトープと特異的に反応するヒトモノクローナル抗体に関する。かかる抗体は、ヒト患者、特に幼児および幼い子供におけるRSV感染の治療的および／または予防的処理に有用である。

【0002】

(背景技術)

RSウイルス (RSV) は、子供における下部呼吸性疾患の主要な原因であり、世界中の子供において細気管支炎および肺炎の予測可能な例年の流行をもたらす。該ウイルスは感染性が高く、いずれの年齢でも感染が起きる可能性がある。RSV感染およびその臨床的特徴に関する包括的な詳細は、“Respiratory Syncytial Virus”, Ch. 38, B.N. Fields ed., Raven Press (1990)においてMcIntosh, K.およびR. M. Chanock、および“Textbook of Pediatric Disease” Feigin and Cherry, eds., W.B. Saunders, pgs 1247-1268 (1987)において Hall, C.B. による優れた近年の報告から得ることができる。

【0003】

RSVは世界中に分布している。RSVウイルスの疫学の最も顕著な特徴の一つは、上記のように、感染および疾患の一貫したパターンである。他の呼吸性ウイルスは、不規則な間隔で流行病を引き起こすか、または混成した流行病／流行病パターンを示すが、RSVは、大都市中心において毎年かなり大きな流行をもたらす唯一の呼吸性ウイルス病原体である。世界の温帯地域において、RSV流行病は、晩秋、冬または春に主に起こるが、夏には決して起こらない。コミュニティ内での感染の発生および蔓延は特徴的であり、容易に診断され、細気管支炎および小児肺炎ならびに急性下気道疾患を有する幼い子供の入院数においてシャープな上昇をもたらす。大発生が起こる他の呼吸性ウイルス物質は、RSVと

同時期にめったに存在しない。

【0004】

一次RSV感染は非常に幼年において起こる。0～2才の幼児が最も罹患しやすく、一次罹患集団を代表する。該群において、5人のうち1人が感染において下部呼吸（咽頭下）疾患を発病し、この比率は再感染において同様である。自然感染の結果として、1歳までに25～50%の幼児が特異的抗体を有し、これは4～5歳までに100%に近づく。したがって、実際、就学前に全ての子供が感染する。

【0005】

年齢、性別、社会経済および環境的要因は全て、疾患の重篤度に影響を及ぼしうる。RSV感染ケースの1～3%において入院が必要となり、通常、長期間（3週間まで）である。RSV感染の特に幼年期における高い罹患率は、また、後年、呼吸性の問題の発生に関係する。米国および他の先進国における現行の集中治療によると、正常対象に関する全死亡率は低い（入院対象の2%未満）。しかしながら、あまり発展していない国における死亡率は非常に高く、また、先進国においても、心臓病（チアノーゼ性先天性心臓病）または呼吸性疾患（気管支肺形成異常症）下にある幼児におけるようなある特定の危険性のある群において死亡率が高い。例えば、チアノーゼ性先天性心臓病の幼児における死亡率は37%ほどの高さであると報告されている。未熟な幼児において、RSV感染のために無呼吸期間が起こり、稀な場合、神経学的または全身性損傷を引き起こしうる。重篤な下気道疾患（細気管支炎および肺炎）は、6ヶ月以下の患者において最も一般的である。該疾患から見たところ完全に回復したらしい幼児は、何年もの間、呼吸性異常の徴候（頻発する喘鳴、肺機能の低下、頻発する咳、喘息および気管支炎）を示しうる。

【0006】

RSVに対する免疫は短命であるらしく、したがって再感染が頻発する。免疫系がRSV感染および再感染を保護する機構はよく理解されていない。しかしながら、再感染が全ての年齢においてよく起こり、時々、幼児において一次感染から回復したほんの数週間後に起こるので、免疫が部分的にだけ保護するというこ

とは明らかである。成人ならびに非常に小さい幼児においてRSV感染に応答して、血清および分泌抗体（IgA）の両方が検出された。しかしながら、ウイルス性FまたはG糖蛋白質に対する血清抗体、ならびに幼児（1－8ヶ月）に見られる中和抗体の力価は、より高齢の対象において見られる力価の15－25%である。これらの低い力価は、より幼い子供における重篤な感染の発生率の増加に寄与しうる。

【0007】

RSVウイルスに対する保護における血清抗体の役割の証拠は、疫学的ならびに動物研究から明らかになった。該ウイルスに自然に曝露される成人において、感染性は低血清抗体レベルとよく相関した。幼児において、母性伝播した抗体の力価は重篤な疾患に対する耐性と相関する（Glezen, W.P. ら、J. Pediatr. 98: 708-715 (1981)）。他の研究は、下気道疾患の発生率および重篤度が高い血清抗体の存在において減少すること（McIntosh, K. ら、J. Infect. Dis. 138: 24-32 (1978)）および受動的に投与された血清中和抗体の高い力価がRSV感染のコントラットモデルにおいて保護的であることを示したこと（Prince, G.A. ら、Virus Res. 3: 193-206 (1985)）を示す。

【0008】

細胞性免疫を欠く子供は、正常な免疫系を有する子供とは対照的に、感染を抑えることができず、何ヶ月もの間ウイルスを有する。同様に、RSVウイルスで感染させたヌードマウスは、持続的にウイルスを有する。これらのマウスは、感作T細胞の養子移入によって治療できる（Cannon, M.J. ら、Immunology 62: 133-138 (1987)）。

【0009】

要約すると、細胞性および体液性免疫はどちらも、感染、再感染およびRSV疾患に対する保護に関与するようであり、抗原性変量は制限されるが、複数の曝露後でさえ保護免疫は完全ではないようである。

【0010】

パラミオクソウイルス科（paramyxoviridae）に属するRSVは、パラミクソウイルス（paramyxovirus）と同様の特性を有するマイナス鎖非断片化RNAウ

ウイルスである。しかしながら、形態的相違ならびに赤血球凝集素およびノイラミニダーゼ活性の欠失に基づいて、別のニューモウイルス属に置かれた。RSVは、多形態性であり、直径150-300nmの大きさの範囲にある。細胞の外膜から発芽することによってウイルスは成熟し、ビリオンは短い接近して間隔を空けた突出物または「スパイク」を有する膜結合粒子として現れる。RNAゲノムは、9.5kDa~160kDaの大きさの10個の独特のウイルス性ポリペプチドをコードする(Huang, Y.T.およびG.W. Wertz, J. Virol. 43: 150-157 (1982))。7つの蛋白質(F、G、N、P、L、M、M2)がRSVビリオンに存在し、少なくとも3つの蛋白質(F、GおよびSH)が感染した細胞の表面に発現する。F蛋白質に対する特異的抗体がイン・ビトロでのシンシチウム形成を阻害し、組換えF蛋白質を発現しているワクシニアウイルスに感染した細胞が他のRSVウイルス蛋白質の不在下でシンシチウムを形成するので、F蛋白質(配列番号20)は最終的に、細胞融合の原因蛋白質として同定された。対照的に、G蛋白質に対する抗体はシンシチウム形成を阻害せずに、ウイルスの細胞に対する付着を妨げる。

【0011】

RSVは、2つの抗原性が別個のサブグループ、(A&B)に分けることができる(Mufson, M.A.ら、J. Gen'l. Virol. 66: 2111-2124 (1985))。該抗原性二形性は、主として表面付着(G)糖蛋白質に結合する(Johnson, R.A.ら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 84: 5625-5629 (1987))。AおよびB両群の系統は同時に循環するが、各集団は年々、予測不可能に変化しうる。したがって、効果的な治療は、該ウイルスの両サブグループを標的としなければならない、このため、後に議論されるように、mAb治療の標的抗原として高く保存された表面融合(F)蛋白質を選択する。

【0012】

RSVウイルスに対する中和抗体の誘導は、FおよびG表面糖蛋白質に限定されるようである。これらの2つの蛋白質のうち、F蛋白質は、RSVウイルスの異なる系統に対する保護と関連した交差反応性中和抗体の主要な標的である。さらに、マウスまたはコトンマウスのF蛋白質での実験的予防接種もまた、交差保

護をもたらす。ウイルスの系統およびサブグループを交差するF蛋白質の抗原性の関係はアミノ酸レベルの高度な相同性において反映される。対照的に、RSVの2つのサブグループおよび種々の系統において、抗原二形性は主としてG糖蛋白質に関連付けられる。F蛋白質は、予測分子量68-70 kDa；そのN末端にシグナルペプチド；C末端に膜アンカードメインを有し、ビリオンアセンブリの前に感染細胞において蛋白質分解的に分裂してジスルフィド結合したF₂およびF₁を生じる。5つの中和エピトープがF蛋白質配列（配列番号20）内に同定され、205-225；259-278；289-299；483-488および417-438残基に位置決定された。F蛋白質（配列番号20）における配列変化の頻度を決定するための研究は、中和エピトープの大部分がオーストラリア、ヨーロッパおよび米国の地域において30年間にわたって単離された23系統のRSVウイルスの全てにおいて保存されていたことを示した。別の研究において、サブグループAまたはサブグループB系統での一次感染に対する43人の幼児および幼い子供の血清応答は、同種および異種F抗原に対する応答が有意に異なるものではなく、一方、サブグループAおよびB系統のG蛋白質は全く無関係であったことを示した。さらに、イン・ビトロでのウイルス媒介性細胞融合の抗体阻害対感染の阻害は動物モデルにおける保護と最もよく相関し、融合阻害は主にF蛋白質特異的抗体に限られる。

【0013】

したがって、RSV感染の予防的処理は、高い危険性のある子供の群ならびに発展途上国の全ての子供について望ましい。しかしながら、RSV感染のためのワクチンは、現在、入手できない。1960年代に試験された減弱した全ウイルスワクチンを取り囲む安全性が厳しくなり、ならびにより新しい候補サブユニットワクチンに関連した誘導される免疫病理学の可能性は、近い将来におけるワクチンの見通しが遠いことを明らかにする。今までのところ、1の薬物療法、幅広い範囲の抗ウイルス性であるリバビリン（Ribavirin）が認可された。リバビリンは、投与、穏かな毒性および疑わしい効力の問題のために最小限の容認を獲得したにすぎない。大多数の場合、入院した子供は薬物療法を受けず、非常に高価な集中的支持療法のみを受ける。RSV感染の治療のための安全で効果的かつ容

易に投与される薬物に対する要望があることは明らかである。

【0014】

ヒトにおける受動的抗体療法の使用は、よく報告されており、肝炎およびサイトメガロウイルスのような他の感染性疾患を治療するために用いられている。RSVに対する受動的抗体治療／予防の可能性は、動物モデルを用いてよく確立された。RSVを包含する感染性物質に対する動物における初期の受動的移入研究のほとんどは、ネズミmAbを利用した。動物における研究は、明らかに、FおよびG糖蛋白質の両方に対するポリクローナルおよびモノクローナル抗体が予防的または治療的に与えられた場合にRSVウイルス感染において受動的保護を授与できることを証明した（Princeら、前掲）。これらの研究において、中和FまたはG mAbのマウス、コトンラットまたはサルへの受動的移入は、肺におけるRSVウイルスの複製を有意に減少するか、または完全に防止する。しかしながら、上記のように、明らかに、F蛋白質は抗体療法により重要な標的である。

【0015】

近年、FDAは、プールしたヒト血清から単離された静脈内ガンマグロブリン（IVIg）の使用を認可した。該研究の最初の報告が奨励されてきた（Groothuis, J.R.ら、Antimicrob. Agents Chemo. 35(7): 1469-1473 (1991)）。しかしながら、IVIgの一般的な欠点が存在し、制限するものではないが、かかる生産物はヒト血液由来であり、有効投与量を達成するためには、しばしば何グラムもの抗体が投与されなければならないという事実を包含する。

【0016】

別法では、モノクローナル抗体が使用された。かかるアプローチの利点は：より高濃度の特異的抗体が達成でき、それにより投与されるべきグロブリンの量を減少できること；直接的な血液生産物への依存を排除できること；調製物中の抗体のレベルをより均一に調節できることおよび投与経路を広げることができることを包含する。異種（例えば、ネズミ）由来のモノクローナル抗体を用いる受動的免疫療法が提案されたが（PCT出願第PCT/US94/08699号、公開番号第WO95/04081号を参照のこと）、外来抗体に対して向けられた患者の一部における望ましくない免疫応答の危険性を減少させるための1の選択

肢は、「ヒト化」抗体を使用することである。これらの抗体は、実質的にヒト起源であり、非ヒト起源の相補性決定領域（CDR）だけを有する。該アプローチの特に有用な例は、PCT出願第PCT/GB91/01554号、公開番号第WO92/04381号およびPCT出願第PCT/GB93/00725号、公開番号第WO93/20210号に開示されている。幼い子供におけるRSV感染の治療のためのヒト化抗体の効力を評価するための臨床試験は進行中である。

【0017】

第2およびより好ましいアプローチは、完全ヒトmAbを使用することである。不運にも、伝統的なハイブリドーマ技術によるヒトモノクローナル抗体の製造における成功例はほとんどない。実際、許容されるヒト融合パートナーは同定されておらず、ネズミミエローマ融合パートナーはヒト細胞とよく作動せず、不安定で低生産量のハイブリドーマ系統を生じる。しかしながら、分子生物学および免疫学における近年の進歩がこの度、ヒトmAb、特に外来感染性物質に向けられたヒトmAbを単離することを可能にした。

【0018】

RSV F蛋白質（配列番号20）に対する完全ヒトmAbは、該疾患の治療に望ましい選択を残している。かかるmAbのフラグメントの取得におけるいくつかの成功例が報告されたが（Barnbas, C.F.ら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 89: 10164-10168 (1992); Crowe, J.E.ら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA 91: 1386-1390 (1994)および1994年3月31日に公開番号第WO94/06448号として公開されたPCT出願第PCT/US93/08786号）、かかる結果の達成は容易ではない。しかしながら得られた新規なヒトmAbは、単独または免疫治療組成物を形成するための既存の分子と組み合わせて特に有用である。

当該分野において、RSVの予防または受動的治療に有用な予防的組成物に対する要望が存在する。

【0019】

（発明の開示）

発明の簡単な記載

1の態様において、本発明は、RSVのF蛋白質エピトープと特異的に反応し、RSV感染を中和できる完全ヒトモノクローナル抗体およびその機能的フラグメントを提供する。RSVウイルスのF蛋白質に特異的なこれらのヒトmAbは、感染を受動的に治療または予防するのに有用でありうる。

【0020】

もう1つ別の態様において、本発明は、ヒト抗体配列のランダムコンビナトリアルクローニングによって生産され、繊維状ファージFabディスプレイライブラリーから単離されるRSVのF蛋白質に特異的な中和一本鎖Fvフラグメント(scFv)に修飾を提供する。

またもう1つ別の態様において、第1のヒトドナー由来のヒトHおよびL鎖不変領域および第2のヒトドナーから由来のRSVのF蛋白質に対するヒト中和モノクローナル抗体由来のHおよびL鎖可変領域またはそのCDRを含有する新形態(reshaped)または改変抗体が提供される。

【0021】

さらにもう1つ別の態様において、本発明は、1(またはそれ以上)の改変または新形態抗体および医薬上許容される担体を含有する医薬組成物を提供する。

さらにもう1つ別の態様において、本発明は、少なくとも1投与量の免疫治療上有効量の本発明の新形態、改変またはモノクローナル抗体を少なくとも1つの付加的なモノクローナル、改変または新形態抗体と組み合わせて含んでなる医薬組成物を提供する。付加的な抗体が、本発明の対象抗体とは異なるRSV F蛋白質抗原のエピトープと反応することによって本発明の対象抗体と区別される抗-RSV抗体である特定の具体例が提供される。

【0022】

さらなる態様において、本発明は、RSV感染の予防的または治療的处理に有効な量の本発明の医薬組成物をヒトに投与することによる、ヒトにおけるRSV疾患の受動的免疫療法の方法を提供する。

さらにもう1つ別の態様において、本発明は、RSVのF蛋白質に対するヒト中和モノクローナル抗体(mAb)から由来のヒトおよび改変抗体(例えば、操

作された (engineered) 抗体、CDR、F a b または F (a b)₂ フラグメント、またはその類似体) の組換え生産の方法および該組換え生産に有用な成分を提供する。これらの成分は、該抗体をコードしている単離核酸配列、組換えプラスミドでトランスフェクトされる宿主細胞 (好ましくは哺乳動物細胞) におけるその発現を指示することのできる選択された調節配列の制御下で核酸配列を含有する組換えプラスミドを包含する。生産方法は、本発明のトランスフェクト宿主細胞システムをヒトまたは改変抗体が該細胞中で発現するような条件下で培養し、それから発現した生産物を単離することを含む。

【0023】

本発明のまた別の態様において、生物学的流体の試料を本発明のヒト抗体および改変抗体およびそのフラグメントと接触させ、該ヒト抗体 (または改変抗体、またはそのフラグメント) と R S V との間の結合の出現についてアッセイすることの特徴とする、ヒトにおいて R S V の存在を診断する方法である。

本発明の他の態様および利益は、詳細な記載およびその好ましい具体例においてさらに記載される。

【0024】

発明の詳細な記載

本発明は、R S V の F 蛋白質と反応する有用なヒトモノクローナル抗体 (およびそのフラグメント)、該抗体をコードしている単離核酸およびそれらの組換え生産のための種々の方法ならびにかかる抗体およびそのフラグメントの治療的、予防的および診断的使用を提供する。

【0025】

1. 定義

本明細書および請求の範囲で使用される場合、下記の用語は次のように定義付されている。

「改変抗体」なる語は、改変された免疫グロブリンコーディング領域によってコードされる蛋白質であって、選択された宿主細胞中における発現によって得られうる蛋白質をいう。かかる改変抗体は、免疫グロブリン不変領域の全てまたは一部を欠く操作された抗体 (例えば、キメラ、ヒト化、または新形態もしくは免

疫学的にエディットされたヒト抗体) またはそのフラグメント、例えば、F v、F a b または F (a b ')₂ などである。

【0026】

「改変された免疫グロブリンコーディング領域」なる語は、本発明の改変抗体またはそのフラグメントをコードしている核酸配列をいう。

「新形態ヒト抗体」なる語は、第1のヒトモノクローナルドナー抗体由来の最少で少なくとも1つのCDRが第2のヒトアクセプター抗体中のCDRの代わりに用いられている改変抗体をいう。好ましくは、6個のCDR全てが置換されている。より好ましくは、第1のヒトドナーモノクローナル抗体由来の全抗原結合領域(例えば、F v、F a b または F (a b ')₂) が第2のヒトアクセプターモノクローナル抗体中の対応する領域の代わりに用いられている。最も好ましくは、第1のヒトドナー由来のF a b 領域が第2のヒトアクセプター抗体の適当な不変領域に作動可能に連結して、全長モノクローナル抗体を形成する。

【0027】

「第1の免疫グロブリンパートナー」なる語は、天然(または天然で生じる) CDR-エンコーディング領域がドナーヒト抗体のCDR-エンコーディング領域によって置換されているヒト枠組み構造またはヒト免疫グロブリン可変領域をコードしている核酸配列をいう。ヒト可変領域は、免疫グロブリンH鎖、L鎖(または両方の鎖)、その類似体または機能的フラグメントであることができる。抗体(免疫グロブリン) の可変領域内に位置するかかるCDR領域は、当該分野で既知の方法によって決定できる。例えば、Kabatら(Sequence of proteins of Immunological Interest, 第4版、U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health (1987)) は、CDRを位置決定するための規則を開示する。さらに、CDR領域/構造を同定するのに有用なコンピュータープログラムが知られている。

【0028】

「第2の融合パートナー」なる語は、それに対して第1の免疫グロブリンパートナーがフレーム内または任意の慣用的なリンカー配列の手段によって融合される(すなわち、作動可能に連結された) 蛋白質またはペプチドをコードしてい

るもう1つ別のヌクレオチド配列をいう。好ましくは、融合パートナーは、免疫グロブリン遺伝子であり、そのような場合、「第2の免疫グロブリンパートナー」という。第2の免疫グロブリンパートナーは、同じ（すなわち、同種—第1および第2の改変抗体が同じ供給源由来である）または付加的な（すなわち、異種の）目的の抗体の全不変領域をコードしている核酸配列を包含しうる。それは、免疫グロブリンH鎖またはL鎖（または単一ポリペプチドの一部としての両鎖）でありうる。第2の免疫グロブリンパートナーは、特定の免疫グロブリンクラスまたはイソ型に限定されない。さらに、第2の免疫グロブリンパートナーは、F a b、またはF (a b)₂に見られるように、免疫グロブリン不変領域の一部を含みうる（すなわち、適当なヒト不変領域または枠組み構造領域の分離した部分）。第2の融合パートナーはまた、宿主細胞の外表面上に露出した膜内在性蛋白質をコードしている配列を例えば、ファージディスプレイライブラリーの一部分として、または分析的または診断的検出のための蛋白質、例えば、西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）、β-ガラクトシダーゼなどをコードしている配列を含んでいてもよい。

【0029】

F v、F c、F d、F a b、F a b' またはF (a b')₂なる語は、それらの標準的な意味で用いられる。（例えば、Harlowら、"Antibodies A Laboratory Manual", Cold Spring Harbor Laboratory, (1988)を参照のこと。）

本明細書で使用される場合、「操作された抗体」なる語は、改変抗体の型、すなわち、全長の合成抗体（例えば、抗体フラグメントとは対照的に、キメラ、ヒト化抗体、新形態または免疫学的にエディットされたヒト抗体）であって、ここに、選択されたアクセプター抗体のLおよび／またはH鎖可変ドメインの一部が選択されたエピトープに対して特異性を有する1以上のドナー抗体の類似部分によって置換されている抗体を示す。例えば、かかる分子は、非修飾L鎖（またはキメラL鎖）と結合したヒト化H鎖またはその逆によって特徴付けられる抗体を包含しうる。操作された抗体はまた、ドナー抗体結合特異性を保持するために、アクセプター抗体Lおよび／またはH鎖可変ドメイン枠組み構造領域をコードしている核酸配列の改変によって特徴付けられうる。これらの抗体は、アクセプタ

一抗体由来の1以上のCDR（好ましくは全て）の本明細書に記載のドナー抗体由来のCDRによる置換を含むことができる。

【0030】

「キメラ抗体」なる語は、異種の種由来のアクセプター抗体から由来のLおよびH鎖不変領域と結合したドナー抗体から由来の天然に生じる可変領域（L鎖およびH鎖）を含有する操作された抗体の型をいう。

「ヒト化抗体」なる語は、非ヒトドナー免疫グロブリンから由来のそのCDRを有し、分子の残りの免疫グロブリン由来部分が1以上のヒト免疫グロブリンから由来である操作された抗体の型をいう。さらに、枠組み構造支持残基は、結合アフィニティを保存するように改変されうる（例えば、Queenら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. USA, 86, 10029-10032 (1989), Hodgsonら、Bio/Technology, 9, 421 (1991)を参照のこと）。

【0031】

「免疫学的にエディットされた抗体」なる語は、エディットされた抗体で治療されるべき患者において抗体に対する免疫学的応答の可能性を減少させることを目的としたクローニング人工産物、生殖細胞系増強などに関する領域をエディットするようにドナーおよび／またはアクセプター配列において変化を起こした操作された抗体の型をいう。

「ドナー抗体」なる語は、ドナー抗体の抗原特異性および中和活性特徴と共に改変された免疫グロブリンコーディング領域および得られる発現した改変抗体を提供するように、その可変領域、CDRまたはその他の機能的フラグメントもしくはその類似体の核酸配列を第一の免疫グロブリンパートナーに与える抗体（モノクローナルまたは組換え）をいう。本発明における使用に適当な1のドナー抗体は、F a b G λ -1と称されるヒト中和モノクローナル抗体のF a bフラグメントである。F a b G λ -1は、図3、4、8A-8Fおよび9A-9E（配列番号1-4、13および14）に示されるような可変LおよびH鎖DNAおよびアミノ酸配列G λ -1を有するものとして定義される。

【0032】

「アクセプター抗体」なる語は、そのHおよび／またはL鎖枠組み構造領域お

および／またはそのHおよび／またはL鎖不変領域をコードしている核酸配列の全て（またはいずれか一部、好ましくは全て）を第一の免疫グロブリンパートナーに与える、ドナー抗体に遺伝学的に無関係の供給源由来の抗体（モノクローナルまたは組換え）をいう。好ましくは、ヒト抗体はアクセプター抗体である。

【0033】

「CDR」なる語は、免疫グロブリンHおよびL鎖の超可変領域である抗体の相補性決定領域アミノ酸配列として定義される（例えば、Kabatら、Sequences of Proteins of Immunological Interest、第4版、U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health (1987)を参照）。免疫グロブリンの変可部分において3つのH鎖および3つのL鎖CDR領域（またはCDR領域）がある。したがって、本明細書で使用される場合、「CDR」なる語は、3つのH鎖CDRの全て、または3つのL鎖CDRの全て（または適当ならば、全Hおよび全L鎖CDRの両方）をいう。CDRは、抗原またはエピトープに対する抗体の結合のための大量の接触残基を提供する。本発明における目的のCDRは、ドナー抗体可変HおよびL鎖配列由来であり、天然に生じるCDRの類似体を包含し、その類似体はまた、それらが由来するドナー抗体と同じ抗原結合特異性および／または中和能力を共有または保持する。

【0034】

「抗原結合特異性または中和能力を共有する」なる語は、例えば、Fab G λ -1はある特定のレベルの抗原アフィニティーによって特徴付けられるが、適当な構造環境においてFab G λ -1の核酸配列によってコードされるCDRはより低いまたは高いアフィニティーを有する可能性があることを意味する。にもかかわらず、かかる環境においてFab G λ -1のCDRは、無傷Fab G λ -1と同じエピトープを認識するであろうことが予想される。「機能的フラグメント」は、そのフラグメントが由来する抗体と同じ抗原結合特異性および／または中和能力を保持する、部分的HまたはL鎖可変配列（例えば、免疫グロブリン可変領域のアミノまたはカルボキシ末端での少量の欠失）である。

【0035】

「類似体」は、少なくとも1つのアミノ酸によって修飾されたアミノ酸配列で

あり、ここに、該修飾は、化学的修飾であることができ、または2、3個のアミノ酸（すなわち、10個未満）の置換または再配置であることができ、その修飾は、該アミノ酸配列が非修飾配列の生物学的特徴、例えば、抗原特異性および高アフィニティーを保持することを可能にする。例えば、ある種のエンドヌクレアーゼ制限部位をCDR-エンコーディング領域内または周囲に作成する場合、置換によって（サイレント）突然変異を構築することができる。

【0036】

類似体は、また、対立遺伝子変異として生じてよい。「対立遺伝子変異または修飾」は、本発明のアミノ酸またはペプチド配列をコードしている核酸配列における改変である。かかる変異または修飾は、遺伝コードの縮重に起因するか、または、所望の特徴を提供するように故意に操作されるものである。これらの変異または修飾は、いずれかのコードされたアミノ酸配列における改変を生じて生じなくてもよい。

【0037】

「エフェクター剤」なる語は、改変抗体、および／またはドナー抗体の天然もしくは合成のLまたはH鎖あるいはドナー抗体の他のフラグメントが常法により結合しうる非蛋白質担体分子をいう。かかる非蛋白質担体は、診断分野において使用される慣用的な担体、例えば、ポリスチレンまたは他のプラスチックビーズ、多糖類、例えば、BIAcore (Pharmacia) システムにおいて使用されるような多糖類、または医学分野において有用であって、ヒトおよび動物への投与に安全な他の非蛋白質物質を包含することができる。他のエフェクター剤は、重金属原子または放射性同位体をキレートするための大環状環を包含しうる。かかるエフェクター剤、例えば、ポリエチレングリコールは、また、改変抗体の半減期を増加するのに有用でありうる。

【0038】

II. コンビナトリアルクローニング

上記のように、いくつかの問題が、ハイブリドーマ技術のヒトモノクローナル抗体の作成および単離への直接的応用を阻害してきた (G. KohlerおよびC. Milstein, Nature, 256: 495-497 (1975))。これらのなかでも、ハイブリドーマ細

胞系統を形成するために用いられる適当な融合パートナーミエローマ細胞系統がないことならびに形成された場合でもかかるハイブリドーマの安定性が乏しいことである。これらの欠点は、末梢循環におけるウイルス特異的B細胞の不足のため、RSVの場合においてさらに悪化する。したがって、コンビナトリアルクローニングの分子生物学的アプローチが好ましい。

【0039】

コンビナトリアルクローニングは、一般的に、PCT公開第WO90/14430号に開示されている。簡単に言えば、コンビナトリアルクローニングの目的は、細菌細胞の集団にヒト細胞、組織または器官の免疫学的遺伝子キャパシティを移入することである。免疫適格性の細胞、組織または器官を用いることが好ましい。特に有用な供給源は、限定するものではないが、脾臓、胸腺、リンパ節、骨髄、扁桃および末梢血リンパ球を包含する。細胞は、イン・ビトロでRSVによって刺激されていてもよく、または免疫応答を生じたことがわかっているドナーもしくはHIV⁺であるが無症候性のドナーから選択されうる。

【0040】

ドナー細胞から単離された遺伝子情報は、DNAまたはRNAの形態であることができ、都合のよいことには、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）または同様の技術によって増幅される。RNAとして単離される場合、遺伝子情報は好ましくは、増幅前に逆転写によってcDNAに変換される。増幅は総合的であるかまたはより詳細に調整されることができる。例えば、PCRプライマー配列の注意深い選択によって、免疫グロブリン遺伝子または遺伝子のクラス内のサブセットの選択的増幅を達成することができる。

【0041】

いったん成分遺伝子配列、この場合、種々のHおよびL抗体鎖の変領域をコードしている遺伝子を得たならば、LおよびH鎖遺伝子をランダムな組み合わせで結合してランダムコンビナトリアルライブラリーを形成する。コンビナトリアルクローニングを容易にするための種々の組換えDNAベクター系が記載されている（例えば、PCT公開第WO90/14430前掲；ScottおよびSmith, Science 249:386-406 (1990)；または米国特許第5223409号参照）。コンビ

ナトリアルライブラリーを作成すると、発現後、都合のよいことには生産物をRSV F蛋白質でバイオパンニングすることによって、または必要ならば、より詳細に下記するようなエピトープ遮断バイオパンニングによってスクリーンできる。

本明細書に記載するように、コンビナトリアルクローニングおよびスクリーニングには1本鎖抗体を使用することが好ましく、次いで、所望の候補分子の選択後に、それらを全長mAbに変換する。しかしながら、mAbのFabフラグメントもまた、クローニングおよびスクリーニングに使用することができる。

【0042】

III. 抗体フラグメント

本発明は、RSVのF蛋白質に向けられた誘導全長mAbに対するscFv、FabまたはF(ab')₂フラグメントの使用を意図する。これらのフラグメントは独立して、RSV-媒介性症状に対するイン・ビボでの保護的および治療的物質としてまたはRSV診断の一部としてイン・ビトロで有用でありうるが、それらは、新形態ヒト抗体の成分として本明細書において使用される。scFvフラグメントは、L-リンカー-HまたはH-リンカー-L配向のいずれかにおいて約12アミノ酸のリンカーによって連結されたLおよびH鎖可変領域を含有する。Fabフラグメントは、全L鎖とH鎖のアミノ末端部分を含有し；F(ab')₂フラグメントは付加的なジスルフィド結合によって結合された2つのFabフラグメントによって形成されたフラグメントである。RSV結合モノクローナル抗体は、コンビナトリアルファージライブラリーから得ることのできるscFvまたはFabフラグメントの供給源を提供する（例えば、Winterら、Ann. Rev. Immunol., 12: 433-455 (1994)またはBarbasら、Proc. Nat'l. Acad. Sci. (USA) 89, 10164-10168 (1992)参照、どちらもこれにより、出典明示により全体として組み込まれる）。

【0043】

IV. 目的の抗-RSV抗体アミノ酸およびヌクレオチド配列

Fab G₂-1または本明細書に記載の他の抗体は、ドナー抗体の抗原結合特異性によって特徴付けられる種々の改変抗体の設計および獲得に有用な配列、

例えば、可変Hおよび／またはL鎖ペプチド配列、枠組み構造配列、CDR配列、機能的フラグメント、およびその類似体、およびそれをコードしている核酸配列を与えうる。

【0044】

一例として、このように本発明は、RSVヒトFab G λ -1A由来の可変L鎖および可変H鎖配列およびそれから由来の配列を提供する。Fab G λ -1AのH鎖可変領域は、図4、8A-8Fおよび10A-10B（配列番号3-4、13および15）に示される。

【0045】

可変L鎖およびH鎖ペプチド配列をコードしている本発明の核酸配列またはそのフラグメントは、また、CDRまたは枠組み構造領域をコードしている核酸配列内における特定の変化の突然変異誘発性導入、および発現用プラスミド中への得られた修飾または融合核酸配列の組み込みに有用である。例えば、枠組み構造およびCDR-エンコーディング領域のヌクレオチド配列におけるサイレント置換は、突然変異を起こさせたCDR（および／または枠組み構造）領域の挿入を容易にする制限酵素部位を作成するために使用することができる。これらのCDR-エンコーディング領域は、本発明の新形態ヒト抗体の構築に用いてもよい。

【0046】

遺伝コードの縮重を考慮して、本発明の可変HおよびL鎖アミノ酸配列およびCDR配列ならびにドナー抗体の抗原特異性を共有するその機能的フラグメントおよび類似体をコードする種々のコーディング配列が構築されうる。可変鎖ペプチド配列またはCDRをコードしている本発明の単離核酸配列またはそのフラグメントは、第2の免疫グロブリンパートナーと作動可能に結合される場合、改変抗体、例えば、キメラまたはヒト化抗体、または本発明の他の操作された抗体を生産するために使用することができる。

【0047】

本明細書に記載の改変抗体の一部をコードしている単離核酸配列のほかに、天然CDR-エンコーディング配列に相補的な配列またはCDR-エンコーディング領域の周囲のヒト枠組み構造領域に相補的な配列のような他のかかる核酸配列

が本発明に包含されることに注目すべきである。かかる配列は、遺伝コードの縮重によって図3および4（配列番号2および4）に示されるのと同じアミノ酸配列をコードできる全ての核酸配列を包含する。図6および7（配列番号5-12）は、かかる配列の提示を提供する。本発明に包含される他の有用なDNA配列は、ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件下（T. Maniatisら、Molecular Cloning (A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory (1982), pages 387-389参照）でG λ -1抗体をコードしているDNA配列（例えば、図3、4、8A-8F〜11（配列番号1-4、13-16）の配列）にハイブリダイズし、該抗体の抗原結合性を保持する配列を包含する。1のかかるストリンジェントなハイブリダイゼーション条件の例は、4 x S S C、65℃でハイブリダイゼーションし、次いで、0.1 x S S C、65℃で1時間洗浄する。別法では、例示的ストリンジェントなハイブリダイゼーション条件は、50%ホルムアミド、4 x S S C中42℃である。好ましくは、これらのハイブリダイズするDNA配列は、少なくとも約18ヌクレオチド長、すなわち、およそのCDRの大きさである。

【0048】

V. 改変された免疫グロブリンコーディング領域および改変抗体

改変された免疫グロブリンコーディング領域は、キメラ抗体、ヒト化、新形態および免疫学的にエディットされたヒト抗体のような操作された抗体を包含する改変抗体をコードする。所望の改変された免疫グロブリンコーディング領域は、アクセプター免疫グロブリンパートナー中に挿入される、RSV抗体、好ましくは、本発明によって提供されるような高アフィニティー抗体の抗原特性を有するペプチドをコードするCDR-エンコーディング領域をs c F v領域の形態で含有する。

【0049】

アクセプターが免疫グロブリンパートナーである場合、上記のように、それは、目的の第2の抗体領域、例えば、Fc領域をコードしている配列を包含する。免疫グロブリンパートナーは、また、それに対してLまたはH鎖不変領域がフレーム内またはリンカー配列の手段によって融合する別の免疫グロブリンをコー

ドしている配列を包含しうる。RSVの機能的フラグメントまたは類似体に向けられた操作された抗体は、同じ抗体との強化された結合をもたらすように設計されていてもよい。

【0050】

免疫グロブリンパートナーは、また、免疫グロブリンパートナーが常法により作動可能に連結されうる非蛋白質担体分子を包含する上記のエフェクター剤と結合していてもよい。

免疫グロブリンパートナー、例えば、抗体配列とエフェクター剤との間の融合または結合は、いずれかの適当な手段によって、例えば、慣用的な共有結合またはイオン結合、蛋白質融合、またはヘテロ二官能性交差リンカー、例えば、カルボジイミド、グルタルアルデヒドなどによるものであってもよい。かかる技術は当該分野で既知であり、従来の化学および生物化学テキストに容易に記載されている。

【0051】

さらに、単に第2の免疫グロブリンパートナーとエフェクター剤の間に所望の量の空間を提供するにすぎない慣用的なリンカー配列もまた、改変された免疫グロブリンコーディング領域中に構築されてもよい。かかるリンカーの設計は当業者によく知られている。

さらに、本発明の分子のシグナル配列を発現を増加するように修飾してもよい。例えば、F a b G λ -1 H鎖配列由来のシグナル配列およびCDRを有する新形態ヒト抗体は、キャンパス (Campath) リーダー配列のような別のシグナル配列で置換された元のシグナルペプチドを有していてもよい (Page, M. J. ら、BioTechnology 9:64-68 (1991))。

例示的な改変抗体、新形態ヒト抗体は、第2のヒト抗体から由来の不変H領域C_{H-1}-C_{H-3}に融合したF a b G λ -1の抗原特異性を有する可変Hおよび全L鎖ペプチドまたは蛋白質配列を含有する。

【0052】

またさらなる具体例において、本発明の操作された抗体は、それに付加的な物質を接着させていてもよい。例えば、組換えDNA技術の手法を用いて、Fcフ

ラグメントまたは完全な抗体分子の $C_{H-2}C_{H-3}$ ドメインが酵素または他の検出可能な分子（すなわち、ポリペプチドエフェクターまたはリポーター分子）によって置換された本発明の操作された抗体を生産してもよい。

本発明のもう1つ別の所望の蛋白質は、全長のHおよびL鎖を有する完全な抗体分子、またはそのいずれかの分離したフラグメント、例えば、F_abまたはF_(a b')₂フラグメント、H鎖2量体、またはいずれかのその最小組換えフラグメント、例えば、F_vまたは1本鎖抗体（SCA）または選択されたドナーF_ab-G_{λ-1}と同じ特異性を有するいずれか他の分子を含んでいてもよい。かかる蛋白質は、改変抗体の形態で使用されてもよく、またはその非融合形態で使用されてもよい。

【0053】

免疫グロブリンパートナーがドナー抗体と異なる抗体、例えば、いずれかのイソ型または免疫グロブリン枠組み構造もしくは不変領域のクラス由来であるときは必ず、操作された抗体が生じる。操作された抗体は、1の供給源、例えば、アクセプター抗体由来の免疫グロブリン（Ig）不変領域および可変枠組み構造領域、およびドナー抗体、例えば、本明細書に記載の抗-RSV抗体由来の1以上の（好ましくは、全ての）CDRを含むことができる。さらに、核酸またはアミノ酸レベルにおけるアクセプターmAb-Lおよび/またはH可変ドメイン枠組み構造領域またはドナーCDR領域の改変、例えば、欠失、置換または付加は、ドナー抗体抗原結合特異性を保持するために、または潜在的な免疫原性を減少させるために作成されうる。

【0054】

かかる操作された抗体は、RSV mAb（記載のように修飾されていてもよい）の可変Hおよび/またはL鎖の1つ（または両方）あるいは下記で同定されるHまたはL鎖CDRの1以上を用いるように設計される。本発明の操作された抗体は、中和性であり、すなわち、それらは、望ましくは、RSV感染の動物モデルにおいてイン・ビトロおよびイン・ビボでウイルス増殖を阻害する。

【0055】

かかる操作された抗体は、RSV抗体機能的フラグメントに融合したヒトHお

よびL鎖不変領域を含有する新形態ヒト抗体を包含しうる。適当なヒト（または他の動物）アクセプター抗体は、慣用的なデータベース、例えば、K A B A T[®]（登録商標）データベース、L o s A l a m o sデータベースおよびS w i s s P r o t e i nデータベースから、ドナー抗体のヌクレオチドおよびアミノ酸配列に対するホモロジーによって選択されたものであってもよい。ドナー抗体の枠組み構造領域に対するホモロジー（アミノ酸に基づく）によって特徴付けられるヒト抗体は、ドナーCDRを挿入するためのH鎖不変領域および／またはH鎖可変枠組み構造領域を提供するのに適当でありうる。L鎖不変または可変枠組み構造領域を与えることのできる適当なアクセプター抗体は、同様に選択される。アクセプター抗体HおよびL鎖が同じアクセプター抗体から由来する必要がないことに注目すべきである。

【0056】

望ましくは、異種枠組み構造および不変領域をヒト免疫グロブリンクラスおよびイソ型、例えば、I g G（4のうちサブタイプ1）、I g M、I g AおよびI g Eから選択する。F cドメインは、天然配列に限定されないが、機能を改変する当該分野で既知の突然変異変種を包含する。例えば、突然変異は、ある特定のI g G抗体のF cドメインにおいてF c-媒介性補体およびF c受容体結合を減少させ（A.R. Duncanら、Nature, 332:563-564 (1988); A.R. DuncanおよびG. Winter, Nature, 332:738-740 (1988); M.L. Alegreら、J. Immunol. 148: 3461-3468 (1992); M.-H. Taoら、J. Exp. Med. 178:661-667 (1993);およびV. Xuら、J. Biol. Chem., 269:3469-2374 (1994)）；クリアランス率を改変し（J. K. Kimら、Eur. J. Immunol., 24: 542-548 (1994)）；構造的異種性を減少させる（S. Angalら、Mol. Immunol. 30: 105-108 (1993)）ことが記載された。また、I g Mの尾部セグメントの付加または他の突然変異（R.I.F. SmithおよびS.L. Morrison, Biotechnology 12: 683-688 (1994); R.I.F. Smithら、J. Immunol., 154: 2226-2236 (1995)）あるいはI g Aの尾部セグメントの付加（I. Karivら、J. Immunol., 157: 29-38 (1996)）による抗体のオリゴマー化のような他の修飾が可能である。しかしながら、アクセプター抗体は、ヒト免疫グロブリン蛋白質配列のみを含む必要はない。例えば、ヒト免疫グロブリン鎖のDNA配列エンコ

ーディング部分がポリペプチドエフェクターまたはレポーター分子のような非免疫グロブリンアミノ酸配列をコードしているDNA配列に融合している遺伝子を構築してもよい。

【0057】

したがって、改変抗体は、好ましくは、天然ヒト抗体またはそのフラグメントの構造を有し、効果的な治療的用途、例えば、ヒトにおけるRSV媒介疾患の治療または診断的用途に必要とされる特性の組み合わせを有する。

改変抗体がさらに、ドナー抗体の特異性および高アフィニティーに決して影響を及ぼすことなく、可変ドメインアミノ酸における変化によって修飾されうること、当業者に理解されるであろう（すなわち、類似体）。HおよびL鎖アミノ酸が可変ドメイン枠組み構造またはCDRまたはその両方において他のアミノ酸によって置換されうことは予想される。特に、本明細書における実施例に説明されるように、かかる再構築された配列の免疫学的エディティングが好ましい。

【0058】

さらに、可変または不変領域は、上記のように、本発明の分子の選択的特性を強化または減少するように改変されうる。例えば、2量化、Fc受容体への結合、または補体を結合し活性化する能力である（例えば、Angalら、Mol. Immunol. , 30: 105-108 (1993); Xuら、J. Biol. Chem. 269: 3469-3474 (1994);およびWinterら、EP 307,434-B参照）。

かかる抗体は、下記のように、RSV媒介疾患の予防および治療に有用である。

【0059】

V I. 改変抗体および操作された抗体の生産

本発明の得られる新形態ヒト抗体は、組換え宿主細胞、例えば、COS、CHOまたはミエローマ細胞において発現できる。慣用的な発現ベクターまたは組換えプラスミドは、改変抗体のこれらのコーディング配列を宿主細胞中における複製および発現および／または宿主細胞からの分泌を制御できる慣用的な調節配列と作動可能に結合して配置することによって生産される。調節配列は、他の既知の抗体から得ることのできるプロモーター配列、例えば、CMVプロモーター、

およびシグナル配列を包含する。同様に、相補的抗体LまたはH鎖をコードするDNA配列を有する第2発現ベクターを生産することができる。好ましくは、該第2発現ベクターは、コーディング配列および選択マーカが関係することを除き、第1のベクターと同一である。これは、可能な限り、各ポリペプチド鎖が機能的に発現されることを保証する。別法では、改変抗体のHおよびL鎖コーディング配列は、単一ベクター上に残存しうる。

【0060】

選択された宿主細胞は、慣用的な技術によって、第一および第二のベクターと同時トランスフェクトして（または単純に単一ベクターでトランスフェクトして）、組換えまたは合成LおよびH鎖の両方を含む本発明のトランスフェクト宿主細胞を作成する。次いで、トランスフェクト細胞を慣用的な技術によって培養して、本発明の操作された抗体を生産する。組換えH鎖およびL鎖の両方のアソシエーションを包含する抗体の生産は、固相酵素免疫アッセイ（ELISA）またはラジオイムノアッセイ（RIA）のような適当なアッセイによって培養物中において測定される。同様の慣用的な技術を用いて、本発明の他の改変抗体および分子を構築してもよい。

【0061】

本発明の方法および本発明の組成物の構築において用いられるクローニングおよびサブクローニング段階に適当なベクターは、当業者によって選択される。例えば、慣用的なpUCシリーズのクローニングベクターが用いられる。使用される1のベクターはpUC19であり、Amersham (Buckinghamshire, United Kingdom) またはPharmacia (Uppsala, Sweden) のような供給会社から市販されている。容易に複製でき、クローニング部位および選択遺伝子（例えば、抗生物質耐性）を豊富に有し、取り扱いが簡単ないずれのベクターをクローニングに用いてもよい。したがって、クローニングベクターの選択は、本発明における制限的因子ではない。

【0062】

同様に、本発明による操作された抗体の発現に用いられるベクターは、いずれかの慣用的なベクターから当業者によって選択されうる。好ましいベクターは、

例えば、pCDまたはpCNを包含する。ベクターは、また、選択された宿主細胞中における異種DNA配列の複製および発現を指示する選択された調節配列（例えば、CMVプロモーター）を含有する。これらのベクターは、操作された抗体または改変された免疫グロブリンコーディング領域をコードする上記のDNA配列を含有する。さらに、ベクターは、即座の操作に望ましい制限部位の挿入によって修飾された選択された免疫グロブリン配列を組み込んでいてもよい。

【0063】

発現ベクターは、また、異種DNA配列、例えば、哺乳動物ジヒドロ葉酸レダクターゼ遺伝子（DHFR）の発現を増幅するのに適当な遺伝子によって特徴付けられうる。他の好ましいベクター配列は、ウシ成長ホルモン（BGH）およびベータグロビンプロモーター配列（betaglopro）のようなポリアデニル化（ポリA）シグナル配列を包含する。本明細書において有用な発現ベクターは、当業者によく知られた技術によって合成されうる。

かかるベクターの成分、例えば、レプリコン、選択遺伝子、エンハンサー、プロモーター、シグナル配列などは、選択された宿主中における組換えDNAの生産物の発現および／または分泌を指示するのに使用するために、商業的または天然起源から得ても、または既知の手法によって合成されてもよい。哺乳動物、細菌、昆虫、酵母および真菌発現の分野において多数の型が知られている他の適当な発現ベクターもまた、この目的のために選択されうる。

【0064】

本発明は、また、操作された抗体またはその改変された免疫グロブリン分子のコーディング配列を含有する組換えプラスミドでトランスフェクトされた細胞系統を包含する。これらのクローニングベクターのクローニングおよび他の操作に有用な宿主細胞もまた、慣用的である。しかしながら、もっとも望ましいことに、イー・コリ（E. coli）の種々の系統由来の細胞は、クローニングベクターの複製および本発明の改変抗体の構築における他の段階に使用される。

本発明の操作された抗体または改変抗体の発現に適当な宿主細胞または細胞系統は、好ましくは、CHO、COS、繊維芽細胞（例えば、3T3）および骨髓細胞のような哺乳動物細胞、より好ましくは、CHOまたは骨髓細胞である。ヒ

ト細胞を使用してもよく、したがって分子をヒトグリコシル化パターンで修飾できる。別法では、他の真核細胞系統を用いてもよい。適当な哺乳動物宿主細胞の選択および形質転換、培養、増幅、スクリーニングならびに生産物生産および精製の方法は当該分野で既知である。例えば、SambrookらMolecular Cloning (A Laboratory Manual), 2nd edit., Cold Spring Harbor Laboratory (1989)を参照のこと。

【0065】

細菌細胞は、本発明の組換え s c F v、F a b および M A b の発現に適当な宿主細胞として有用であることが証明されうる（例えば、Plueckthun, A., Immunol. Rev., 130, 151-188 (1992)）。F a b は通常グリコシル化せず、発現を輸出するように操作でき、それにより、ミスフォールディングを容易にする高濃度を低下させることができるので、細菌細胞において発現された蛋白質が非フォールディングまたは不適当なフォールディング形態あるいは非グリコシル化形態である傾向は、たいして問題ではない。にもかかわらず、細菌細胞において生産されたいずれの組換え F a b も、抗原結合能力の保持についてスクリーンされるであろう。細菌細胞によって発現された分子が適当に折りたたんだ形態で生産された場合、その細菌細胞は望ましい宿主であろう。例えば、発現に使用されるイー・コリの種々の系統は、バイオテクノロジーの分野において宿主細胞としてよく知られている。ビー・ズブチリス (B. subtilis)、ストレプトミセス (Streptomyces) の種々の系統、他の細菌などもまた、使用されうる。

【0066】

所望により、当業者に知られた酵母細胞もまた、昆虫細胞、例えば、ドロソフィラ (Drosophila) およびレピドプテラ (Lepidoptera) およびウイルス発現系と同様に宿主細胞として利用可能である（例えば、Millerら、Genetic Engineering, 8, 277-298, Plenum Press (1986) およびそこに引用される参考文献を参照のこと）。

本発明のベクターを構築しうる一般的な方法、本発明の宿主細胞を生産するのに必要なトランスフェクション方法および本発明の改変抗体にかかる宿主細胞から生産するのに必要な培養法は全て、慣用的な技術である。同様に、いったん生

産されたならば、本発明の改変抗体は、硫酸アンモニウム沈殿、アフィニティーカラム、カラムクロマトグラフィー、ゲル電気泳動などを包含する当該分野の標準的な手法にしたがって、細胞培養内容物から精製されうる。かかる技術は、当該分野の技術内であり、本発明を制限しない。

【0067】

新形態抗体のまた別の発現方法は、トランスジェニック動物における発現を利用しうる。例示的系は、米国特許第4873316号に記載されている。該参考文献に記載された発現系は、動物のカゼインプロモーターを使用し、哺乳動物中にトランスジェニック的に組み込まれた場合、雌が所望の組換え蛋白質をその乳中に生産することが可能である。

【0068】

いったん望ましい方法によって発現したならば、次いで、操作された抗体を適当なアッセイを用いてイン・ビトロ活性について試験する。現在、RSVに対する改変抗体の定性および定量的結合を評価するために、慣用的なELISAアッセイ様式が用いられる。さらに、他のイン・ビトロアッセイおよびイン・ビボ動物モデルもまた、通常のクリアランスメカニズムにもかかわらず体における改変抗体の持続性を評価するために行われるその後のヒト臨床的研究の前に、中和効力を確かめるために用いてもよい。

【0069】

VII. 治療的／予防的用途

本発明はまた、本明細書に記載の1以上の抗体（改変、新形態、モノクローナルなど）またはそのフラグメントを包含する有効量の抗体を投与することを特徴とするRSVに関連した症状を体験しているヒトを治療する方法に関する。

本発明の分子の使用によって誘導される治療的応答は、RSVへの結合により生じ、したがってその後、RSV繁殖を阻害する。したがって、本発明の分子は、治療的用途に適した調製物および処方における場合、RSV感染を体験しているヒトに大いに望ましい。例えば、季節的な症状の発現などを治療する場合、より長期の治療が望ましい。投与量および治療の持続期間は、ヒト循環における本発明の分子の相対的な存続期間に関係し、治療されるべき状態および患者の総体

的な健康に依存して当業者によって調整されることができる。

【0070】

本発明の改変抗体、抗体およびそのフラグメントは、また、単独または他の抗体、特に、F蛋白質上の他のエピトープまたは他のRSV標的抗原と反応するヒトまたはヒト化mAbを予防的薬剤として一緒に使用してもよい。

本発明の治療および予防的薬剤の投与様式は、宿主に薬剤をデリバリーするいずれかの適当な経路であってもよい。本発明の改変抗体、抗体、操作された抗体およびそのフラグメント、および医薬組成物は、非経口投与、すなわち、皮下、筋肉内、静脈内または鼻腔内に特に有用である。

【0071】

本発明の治療および予防的薬剤は、本発明の有効量の改変抗体を活性成分として医薬上許容される担体中において含有する医薬組成物として調製されうる。注射用に準備された形態において、好ましくは生理学的pHに緩衝化された抗体を含有する水性懸濁液または溶液が好ましい。非経口投与用組成物は、一般に、医薬上許容される担体、好ましくは水性担体中に溶解した本発明の操作された抗体またはそのカクテルの溶液を含むであろう。種々の水性担体を用いてもよく、例えば、0.4%セーライン、0.3%グリシンなどである。これらの溶液は、滅菌状態であり、一般に、粒子物質を含有しない。これらの溶液は、慣用的なよく知られた滅菌技術（例えば、ろ過）によって滅菌されうる。組成物は、およそその生理学的条件に必要とされるようなpH調整剤および緩衝化剤などの医薬上許容される補助物質を含有しうる。かかる医薬処方中における本発明の抗体の濃度は、幅広く変化することができ、すなわち、約0.5重量%より少ないものから、通常または少なくとも1重量%、15または20重量%ほどの大きさまでで変化でき、選択された特定の投与様式にしたがって、主に流体容積、粘度などに基づいて選択されるであろう。

【0072】

したがって、筋肉内注射用の本発明の医薬組成物は、1mL滅菌緩衝化水および約1ng～約100mg、例えば、約50ng～約80mgまたはより好ましくは、約5mg～約75mgの本発明の操作された抗体を含有するように調製でき

た。同様に、静脈内注入用の本発明の医薬組成物は、約250mlの滅菌リンガー液および約1mg〜約75mg/mlおよび好ましくは5mg〜約50mg/mlの本発明の操作された抗体を含有するように調製できた。非経口投与可能な組成物を調製するための実際の方法は、よく知られているか、または当業者に明らかであり、例えば、“Remington’s Pharmaceutical Science”, 15版, Mack Publishing Company, Easton, Pennsylvaniaにおいてより詳細に記載されている。

【0073】

医薬調製物における場合、本発明の治療剤および予防が単位投与形態で存在することが好ましい。適当な治療上有効投与量は、当業者によって容易に決定できる。ヒトまたは他の動物において炎症性疾患を効果的に治療するために、体重70kgあたり約0.1mg〜約20mgの1投与量の本発明の蛋白質または抗体を非経口、好ましくは、静脈内または筋内投与すべきである。かかる投与量を、必要ならば、内科医によって適宜選択された適当な時間間隔で繰り返してもよい。

【0074】

本発明の改変抗体および操作された抗体は、また、RSV媒介疾患の決定またはかかる疾患の治療の進行を追跡するためのような診断的計画に用いてもよい。診断的試薬として、これらの改変抗体をELISAおよび血清、血漿または他の適当な組織中のRSVレベルまたは培養液中のヒト細胞によるその放出の測定のための他の慣用的なアッセイ様式において使用するために慣用的にラベルしてもよい。改変抗体を用いるアッセイの性質は慣用的であり、該開示を制限しない。

【0075】

本明細書に記載の抗体、改変抗体またはそのフラグメントは、保管のために凍結乾燥でき、使用前に適当な担体中で復元できる。該技術は、慣用的な免疫グロブリンで効果があることがわかっており、当該分野で既知の凍結乾燥および復元技術を用いることができる。

下記の実施例は、例示的な操作された抗体の構築および適当なベクターおよび宿主細胞中におけるその発現を包含する本発明の種々の態様を説明するものである。

り、本発明の範囲を制限するものとして解釈されるべきではない。全てのアミノ酸は慣用的な3文字表記または1文字表記によって示される。全ての必要な制限酵素、プラスミドおよび他の試薬および材料は、別記しない限り、商業的に入手可能である。全ての一般的なクローニングライゲーションおよび他の組換えDNA法は、T. Maniatisら(上掲)またはSambrookら(上掲)において行われたとおりであった。

【0076】

実施例1: G λ -1 scFv-1の単離

1本鎖(sc)Fvライブラリーを故意にRSVに曝露した個体から調製し、記載の手法にしたがって組換えRSV F蛋白質に対して選択した(R. H. Jacksonら、Protein Engineering, A Practical Approach, A. R. Reesら編、Oxford University Press, chapter 12, pp. 277-301, 1992; H. R. Hoogenboomら、Nucl. Acid Res., 19: 4133-4137 (1991); J. D. Marksら、J. Mol. Biol., 222: 581-597 (1991))。簡単に言えば、リンパ球を曝露後15日目に採取した血液試料から単離した。リンパ球から単離したRNAをファージディスプレイのためのscFVエンコーディングレパートリーの調製に用いた。V領域プライマーのセットをH鎖ドメイン1 IgGおよびIgMならびにL鎖C κ およびC λ のための不変領域プライマーと対にし、次いで、オーバーラップPCRによってscFv VH-VL配向において15アミノ鎖スペーサー(グリシン₄-セリン)₃(配列番号21)と連結した(プライマーの記載についてJ. D. Marksら(上掲)を参照)。

【0077】

得られた4つのscFvレパートリー(IgGおよびIgMを有するV κ 、IgGおよびIgMを有するV λ)をpHEN1(H. R. Hoogenboomら(上掲))に類似したファージミドベクター中にクローン化し、scFvのファージfdの遺伝子IIIへの融合をもたらした。次いで、エレクトロポレーションによってベクターをイー・コリ(例えば、TG1系統)中に形質転換して、対応するファージミドライブラリーを得た。

【0078】

s c F v-遺伝子3融合を展示するファージライブラリーをプラスミドライブラリーの各々をM13K07ヘルパーファージで感染させることによって調製し(R. H. Jackson (上掲))、個々に、プラスチック上にコートした組換えF蛋白質に対する2ラウンドのパニングに付した。第1ラウンドにおいて、2.5 mlリン酸緩衝化セーライン(PBS)/2%MarvalTM脱脂乾燥ミルク中における 10^{11} ファージを90分間、5 μ g/mlのF蛋白質でコートした試験管中でインキュベートし(P. Tsuiら, J. Immunol. 157: 772-780 (1996)に記載されている)、次いで、10xPBS/0.05%Tween20で1回洗浄し、10xPBS単独で2回目の洗浄を行った。結合したファージを10mMトリエチルアミンで溶出し、溶出液を1M Tris-HCl、pH7.4で中和した。溶出したファージを増幅し、コーティングするためのF蛋白質の濃度が2 μ g/mlであり、洗浄バッファーが20xPBSを含有したことを除き、第2ラウンドの同様のパニングに付した。

【0079】

イー・コリを溶出したファージで感染させ、各出発ライブラリー由来の96個のコロニーをヘルパーファージで重複感染させ、F蛋白質結合活性についてスクリーンした。たった4個の陽性クローンが2個のIgMライブラリーから得られたが、一方、41個の陽性クローンがIgGライブラリーについて観察された。部分配列分析によって、全クローンが3つの異なるH鎖の1つを有した。6個のクローンのHおよびL鎖V領域の完全な配列は、全て、IgGライブラリーから得られた。

【0080】

これらの6個のクローンの各々の滴定濃度(titered)ファージストックの連続希釈液を組換えF蛋白質およびRSV感染細胞ライゼートへの結合についてELISAによって試験した。全てがF蛋白質への結合を示し、G λ -1と呼ばれるファージが最も良好な活性を示した。しかしながら、G λ -1および3個の他のクローンは、RSVライゼートへの結合をほとんど示さなかった。

【0081】

3つのクローン：G λ -1、G λ -3 (ライゼート結合陽性)、およびG κ -

1 (ライゼート結合陰性) (ここに、「κ」および「λ」はL鎖のクラスを示す) は、F 蛋白質特異的中和モノクローナル抗体によるそれらの結合の競合およびウイルス感染を阻害するそれらの能力についてさらに特徴付けられた。1992年3月19日に公開された国際特許出願公開第WO92/04381号、および1993年10月14日に公開された国際特許出願公開第WO93/20210号に記載された中和mAb RSV19およびB4は、F 蛋白質上の別個のエピトープを認識する。Gκ-1は、両方の抗体によって強く阻害された。Gλ-1は、B4のみによって有意に阻害された。Gκ-3は、いずれの抗体によっても阻害されなかった (Gλ-1だけについて示される; 図1Aおよび1B参照)。最初のアッセイにおいて (表I、実験1-3)、3個のクローン全てがイン・ビトロで中和活性を示し、Gλ-1は最も強力であった (図2、実験2のグラフ) が、一方、scFvを展示していない対照野性型ファージ (M13K07) は効果がなかった。

【0082】

中和がエピトープに関係なくウイルスのファージコーティングだけに起因するという可能性に注目するために、非中和Fab5-16のファージ調製物を同じアッセイにおいて試験した。4つのアッセイのうち3つにおいて、該調製物もまた良好な中和活性を示し、これらのアッセイのうち2つにおいて対照ファージと同様であった (表I、実験4-7)。Fab5-16および対照M13K07ファージの両方による可変中和のこの混乱する結果により、ウイルス中和研究は結論に達しなかった。

【0083】

【表1】

表 1

ファージ試料	ウイルス中和 ($IC_{50} \times 10^{-7}$) ¹ (aru または kru/ml) ²						
	実験番号						
	1	2	3	4	5	6	7
Gk-1 a	1,600		<300				
b				<10	<7		
Gλ-1 a		80	<300				
b				8.1	11		
c							120
Gλ-3 a		900	<300	180			
b					<7	10	
c							730
M13K07a			>10 ⁵	>10 ⁵		>5,000	
b					+全希釈	+全希釈	>10 ⁴
Fab 5-19a				>10 ⁵	40	180	
b							3.5

凡例：

1 M.J. Cannon, J. Virol. Meth., 16:293-301によるアッセイ。100感染中心／ウェルのウイルスを示されたファージの希釈液と一緒に1時間インキュベートし、次いで、感受性細胞に3時間添加した。ウイルス／ファージ溶液を吸引し、新しい培地と交換し、細胞を一晚インキュベートした後、ウイルス感染細胞についてペルオキシダーゼ染色した。

2 a r u＝アンピシリン耐性単位、ファージミド含有粒子の測定単位。

k r u＝カナマイシン耐性単位、ファージゲノムを含有する粒子の測定単位
(M13K07対照の場合のみ)

【0084】

これらの結果を考えると、ファージストック対既知の濃度の抗体蛋白質に依存

する全てのアッセイによってより不明瞭になったが、(1) F-蛋白質へのその見かけのより良好な結合、(2) B4抗体による結合のその選択的阻害および(3) ウイルス中和アッセイにおけるバックグラウンドを超えるその示唆される活性に基づいて、G λ -1が強力な中和抗体のための最も可能性のある候補として選択された。

【0085】

実施例2：G λ -1 s c F VのmAbバージョンAへの変換

G λ -1のVHおよびVL領域のDNAおよびコードされる蛋白質配列を各々、図3（配列番号1および2）および4（配列番号3および4）に示す。哺乳動物細胞における発現の場合、G λ -1プラスミド由来のH鎖可変領域およびL鎖可変領域を抗体鎖の発現がサイトメガロウイルスプロモーター（CMV）プロモーターによって制御されるプラスミドpCDN（Nambi, A.ら、Mol. Cell. Biochem., 131: 75-86 (1994)）の誘導体中にクローン化した。プラスミドpCD-HC68Bは、全長H鎖を発現するために用いられ、プラスミドpCN-HuLCは全長L鎖の発現に用いられる。

【0086】

最初の構築物において、アミノ末端の配列における変化は、プラスミドG λ -1由来のL鎖およびH鎖可変領域をクローニングするために用いられるPCRプライマーによって導入された。これらの構築物において、HおよびL鎖両方のペプチドシグナル配列は、キャンパスL鎖から誘導される（M. J. Pageら、Biotechnology 9: 64-68 (1991)）。可変領域のアミノ末端および枠組み構造4のためのプライマーを用いて、G λ -1のH鎖をG λ -1ファージミドDNAからPCR増幅した。得られたPCRフラグメントをXhoI（アミノ末端プライマーによって導入された部位）およびBstEII（枠組み構造4における天然の部位）で切断し、中間ベクター、F4HCV中にXhoI/BstEII部位にてクローン化した。

【0087】

該クローニングは、G λ -1の可変領域を別の抗-RSV H鎖194-F4の不変領域（ヒトハイブリドーマからSmithKline Beechamでクローン化された）

上に連結した。該中間体クローンをXhoIおよびBsp120Iで切断し、pCD-HC68B中における同じ部位に導入した。XhoI部位はPCRプライマーによってアミノ末端に導入され、pCD-HC68B中に同じ部位でクローン化した場合、キャンパスリーダー配列がフレーム中において先に位置する。Bsp120I部位は天然であり、C_{II-1}ドメインの開始における高く保存された部位であり、pCD-HC68B中に同じ部位でクローン化した場合、C_{II-1}の残りの配列からヒトIgG₁のC_{II-3}領域と一緒にフレーム内にある。得られた構築物、G λ -1Apcd (図8A-8F (配列番号13)) において、キャンパスリーダーのすぐ後のアミノ酸はEVQLE (配列番号17) であり、ここに、残基LEはXhoIクローニング部位のヌクレオチド配列によってコードされている。

【0088】

可変領域のアミノ末端および枠組み構造4のためのプライマーを用いて、G λ -1のL鎖をG λ -1ファージミドDNAからPCR増幅した。得られたPCRフラグメントをSacI (アミノ末端プライマーによって導入された部位) およびAvrII (枠組み構造4における天然部位) で切断し、SacI/AvrII部位で43-1pcn中にクローン化した。該クローニングは、G λ -1の可変領域をフレーム内で別の抗-RSVラムダL鎖43 (P. Tsuiら, J. Immunol., 157: 772-780 (1996)) の不変領域 (ヒト脾臓から単離したRNAから由来のコンビナトリアルライブラリーからSmithKline Beechamでクローン化された) 上に連結した。PCRプライマーによってアミノ末端にSacI部位を導入し、同じ部位で43pcn中にクローン化した場合、フレーム内でキャンパスリーダー配列が先に位置する。したがって、成熟L鎖の最初の2つのアミノ鎖が削除される。得られた構築物、G λ -1Apcn (図9A-9E (配列番号14)) において、リーダーの直後の最初の2つのアミノ酸はELであり、ここに、残基ELはSacIクローニング部位のヌクレオチド配列によってコードされている。

プラスミドG λ -1ApcdおよびG λ -1Apcnのヌクレオチド配列を各々、図8A-8F (配列番号13) および9A-9E (配列番号14) に示す。ベクターの該セットを用いて、COS細胞およびCHO細胞中において抗体G λ

－1 Aを生産した。

【0089】

実施例3：補正したGλ－1 HおよびL鎖のクローニング

1本鎖Fv (s c Fv) フォーマット由来のGλ－1 H鎖の可変領域の全長フォーマット中へのクローニングにおいて、クローニング目的のために、アミノ末端の5番目のアミノ酸をValからLeuへ変化させた。この変化を補正するために、PCRプライマーがpCD中にクローン化したGλ－1 H鎖のアミノ末端のために設計され、それは、5番目のアミノ酸をValに戻した。補正は、補正プライマーおよび外部5' および3' プライマーとして各々、CMVプロモーターおよびCH－2不変領域内の配列にアニールするプライマーを用いるPCRオーバーラップ技術によって導入された。最終的なPCR産物を制限酵素、EcoRIおよびBsp120Iで消化し、Gλ－1 Ap c dベクター中に同じ部位でクローン化してGλ－1 Bp c dを作成した。

【0090】

最終的な構築物を配列決定して、H鎖のアミノ末端がEVQLLE (配列番号17) からEVQLVE (配列番号18) に補正されたことを証明した (図6参照)。補正されたH鎖、Gλ－1 Bのコーディング領域のヌクレオチド配列を図10A－10Bに示す (配列番号15)。

s c Fvフォーマットから全長フォーマットへのGλ－1 L鎖の可変領域のクローニングにおいて、クローニング目的でアミノ末端に変化を導入した。詳細には、L鎖の最初の2つのアミノ酸 (GlnおよびSer) を削除し、3番目のアミノ酸をValからGluへ変化させた。これらの変化を補正するために、pCN中にクローン化されたGλ－1 L鎖のアミノ末端のためにPCRプライマーを設計し、それは、2つの欠失したアミノ酸 (GlnおよびSer) を元の場所に置き、第3のアミノ酸をValに戻した。補正は、補正プライマーおよび外部5' および3' プライマーとして各々、CMVプロモーターおよびλ不変領域内の配列にアニールするプライマーを用いるPCRオーバーラップ技術によって導入された。最終的なPCR産物を制限酵素、EcoRIおよびAvrIIで消化し、Gλ－1 Ap c nベクター中に同じ部位でクローン化して、Gλ－1 Bp c n

を作成した。

【0091】

最終的な構築物を配列決定して、L鎖のアミノ末端が—E LからQ S V L（配列番号10のアミノ酸1—4）へ補正されたことを証明した。

補正されたL鎖のコーディング領域のヌクレオチド配列、Gλ—1 Bを図11に示す（配列番号16）。該ベクターGλ—1 B p c nをGλ—1 B p c dと一緒に用いて、COS細胞およびCHO細胞中において抗体Gλ—1 Bを生産した。

【0092】

実施例4：哺乳動物細胞におけるGλ—1 mABの生産

最初の特徴付けのために、各バージョンのmAb構築物、Gλ—1 A HおよびL鎖、Gλ—1 B HおよびL鎖をCOS細胞中において基本的にCurrent Protocols in Molecular Biology, eds F.N. Ausubelら、1988, John Wiley & Sons, vol. 1, section 9.1に記載のように発現させた。トランスフェクション後1日目に、培養増殖培地を血清不含培地（SmithKline Beecham）で置き換え、それを3日目に交換した。公共に入手可能な培地、ITS™ Premix、インスリン、トランスフェリン、セレンウム混合物（Collaborative Research, Bedford, MA）および1 mg/ml ウシ血清アルブミン（BSA）を捕捉したDME Mを用いて、同様の満足のいく結果が得られる。

【0093】

mAbは、3日および5日目の順化培地から標準的なプロテインAアフィニティークロマトグラフィー法（例えば、Protocols in Molecular Biologyに記載されている）によって、例えば、Prossep Aアフィニティー樹脂（Bioprocessing Ltd., UK）を用いて調製された。

より大量のGλ—1 B mAB（100—200 mg）を生産するために、ベクターを有標のCHO細胞系中に導入した。しかしながら、以前に記載されたようにdhfr⁻ CHO細胞を用いて同様の結果が得られるであろう（P. Hensleyら、J. Biol. Chem., 269: 23949-23958 (1994)）。簡単に言えば、全30 μgの線状化プラスミドDNA（H鎖およびL鎖ベクターのAまたはBセットの各1

5 μ g) を 1×10^7 細胞中にエレクトロポレートした。細胞を最初に、96 ウェルプレート中においてスクレオシド不含培地中で選択する。3~4週間後、増殖陽性ウェル由来の培地をELISAアッセイを用いてヒト免疫グロブリンについてスクリーンする。最も高く発現するコロニーをトランスフェクトしたベクターの増幅について高濃度のメトトレキサート中において広げ、選択する。プロテインAアフィニティークロマトグラフィー (プロテインAセファロース、Pharmacia)、次いで、サイズ排除クロマトグラフィー (Superdex 200, Pharmacia) を用いる標準的な手法によって抗体を順化培地から精製する。

【0094】

溶出した抗体の濃度および抗原結合活性をELISAによって測定する。抗体含有フラクションをブールし、サイズ排除クロマトグラフィーによってさらに精製する。いずれかのかかる抗体について予想されるとおり、SDS-PAGEによって、優勢な蛋白質生産物は、非還元条件下で約150kdに移動し、50および25kdの2つのバンドが還元条件下で現れた。CHO細胞において生産された抗体の場合、SDS-PAGEによる判断によると純度は>90%であり、濃度はアミノ酸分析によって正確に決定された。

【0095】

実施例5: G λ -1 mABの組換えF蛋白質への結合

G λ -1 mABの組換えF蛋白質への結合は、標準的な固相ELISAにおいて測定された。PBS pH7.0中で希釈した抗原をポリスチレン丸底マイクロプレート (Dynatech, Immunolon II) 上に18時間吸着させた。次いで、ウェルを吸引し、1% Tween 20を含有するPBS中における0.5%煮沸カゼイン (BC) (PBS/0.05%BC) で2時間ブロックした。抗体 (50 μ l /ウェル) を0.025% Tween 20を含有するPBS/0.5%BC中において種々の濃度に希釈し、抗原被覆ウェル中で1時間インキュベートした。プレートを0.05% Tween 20を含有するPBSでTitertek 320マイクロプレート洗浄機を用いて3回洗浄し、次いで、1:5000希釈したHRP-標識化プロテインA/G (50 μ l) を添加した。3回洗浄後、TMB_{1ue}基質 (TSI、#TM102) を加え、プレートをさらに15分間インキュベートした。1

NH₂SO₄の添加によって反応を止め、Biotek ELISAリーダーを用いて吸光度を450nmで記録した。

【0096】

Gλ-1mABの抗原結合エピトープを競合ELISAにおいて試験した。Gλ-1mABは、高濃度のRSMU19またはB4、2つの強力な中和mAb（Tempestら、Biotech., 9: 266-271 (1991); Kennedyら、J. Gen. Virol., 69: 3023-3032 (1988)）と混合し、F蛋白質被覆ウェルに加えた。Abrizaら、J. Gen. Virol., 73: 2225-2234 (1992)において以前に記載されたように、mAb RSMU19およびB4によって認識されるエピトープ領域は互いに全く別個である。競合研究において使用されたGλ-1mABの濃度は、F抗原に対して最大90%の結合を与えるように予め決定された。他のmABの存在下でのGλ-1mABの結合は、HRP標識化ヤギ抗ヒトIgGを用いて検出された。反応は上記のように開始した。

【0097】

Gλ-1mABは、ELISAによって組換えF(rF)蛋白質への強力な結合を明らかにした(mAb Bに対するEC₅₀=2.6ng/ml)。Gλ-1mABのrF蛋白質への結合は、抗原認識に不可欠なF蛋白質アミノ酸が配列番号20のアミノ酸268、272および275であるmAb B4によって阻害された。Gλ-1mABのrF蛋白質への結合は、配列番号20のF蛋白質アミノ酸429が抗原認識に不可欠であるmAb RSMU19によって阻害されなかった。これらの結果は、F蛋白質(配列番号20)のアミノ酸255-275の領域における残基がGλ-1mAB認識に不可欠であることを示す。

【0098】

実施例6：Gλ-1mABのイン・ビトロ融合-阻害活性

Gλ-1mABのウイルス誘導性細胞融合を阻害する能力は、イン・ビトロでの微量中和アッセイ(Beelerら、J. Virol., 63: 2941-2950(1989))の修飾を用いて決定された。該アッセイにおいて、50μlのRS Long系統ウイルス(10-100 TCID₅₀/ウェル (American Type Culture Collection ATCC VR-26))を2%ウシ胎児血清(FCS)を含有する最少必須培地(MEM)

中において、37℃、5%CO₂で4時間0.1ml VERO細胞（5×10³/ウェル）（ATCC CCL-81）と混合した。次いで、mABの連続的な2倍希釈液（4連）（50μl）をウイルス感染細胞を含有するウェルに加えた。対照培養物は、ウイルスのみでインキュベートした細胞（陽性ウイルス対照）または培地のみでインキュベートした細胞を含有した。

【0099】

培養物を37℃で5%CO₂中において6日間インキュベートし、そのとき、ウイルス対照ウェル中の細胞病理学的効果（CPE）は>90%であった。細胞病理学的効果の顕微鏡試験は、ELISAによって確認された。培地を培養物から吸引し、50μlの0.6% H₂O₂を含有する90%メタノールで置換した。10分後、固定液を吸引し、プレートを一晩風乾した。1μg/mlのビオチン化RSCHB4（ウシB4mAbのヒトFc誘導体（SmithKline Beecham））、次いで、1:10000希釈したHRP-標識化ストレプトアビジン（Boehringer-Mannheim）を用いて、ウイルス性抗原を固定した培養物中において検出した。TMB1ueを用いて反応を開始し、1N H₂SO₄の添加によって止めた。450nmの吸光度を測定した（O. D. ₄₅₀）。

【0100】

融合-阻害力価は、ウイルス対照と比べてELISAシグナルにおいて50%減少を引き起こした抗体濃度（ED₅₀）として定義付された。標準的なウイルス滴定によるELISAにおいて作成された曲線に基づいて、O. D. ₄₅₀における50%減少はウイルス力価における≥90%減少に相当した。50%点の計算は、用量滴定の回帰分析に基づいた。

Gλ-1mABは、A型RS Long系統ウイルスに対する強力なイン・ビトロ融合-阻害活性を明らかにした（mAB BのED₅₀は、0.51±0.38μg/ml）。該イン・ビトロ融合-阻害アッセイにおいて、Gλ-1mAB Bは、比較アッセイにおけるヒト化mAB RSHZ19（0.4-3.0μg/mlのED₅₀）（Wydeら、Pediatr. Res., 38(4):543-550）より活性であった。

【0101】

実施例 7 : G λ -1 mAB B のイン・ビボ活性 : B a l b / c マウスモデルにおける予防および治療

ヒト RSV の A 2 系統の 10^5 PFU の鼻腔内感染の 24 時間前 (予防) または 4 日後 (治療) のいずれかに、0.06 mg/kg ~ 5 mg/kg 範囲の G λ -1 mAB B を B a l b / c マウス (5/群) に腹腔内接種した。マウスを感染 5 日後に殺した。肺を採取し、ホモジナイズしてウイルス力価を決定した。

ウイルスは、予防的または治療的に ≥ 1.25 mg/kg G λ -1 mAB B で予防的処理を行ったマウスの肺において検出されなかった。下記の表 I I を参照のこと。有意なウイルスのクリアランス ($2-3 \log_{10}$) もまた、0.31 mg/kg G λ -1 mAB B を予防的または治療的に受けた動物において達成された。

【0102】

【表 2】

表 I I : B a l b / c マウスにおける G λ -1 mAB B 予防および治療

処理	用量 (mg/kg)	肺ウイルス力価 (\log_{10} /g 肺)	
		予防	治療
G λ -1 mAB B	5	<1.7	<1.7
	1.25	<1.7	<1.7
	0.31	1.8 \pm 0.3	2.9 \pm 0.4
	0.06	4.3 \pm 0.7	4.5 \pm 0.3
PBS	-	4.8 \pm 0.7	4.7 \pm 0.2

【0103】

G λ -1 mAB は、A および B 型の両方の幅広い範囲の天然 RSV 単離株に対するイン・ビトロにおける強力な抗ウイルス活性を有し、動物モデルにおいて

イン・ビボで予防的および治療的効力を示す。したがって、G λ -1 mABは、ヒトにおける治療的、予防的および診断的適用の候補である。

本明細書に記載された発明を考慮して、本発明の多くの修飾および変更が当業者によって施されうる。かかる修飾は、本発明の明細書および請求の範囲によって包含されると確信する。上記の全ての引用文献は、出典明示により本明細書の一部とされる。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

(1) GENERAL INFORMATION:

- (i) APPLICANT: SmithKline Beecham, PLC
- (ii) TITLE OF INVENTION: Human Monoclonal Antibody
- (iii) NUMBER OF SEQUENCES: 21
- (iv) CORRESPONDENCE ADDRESS:
 - (A) ADDRESSEE: SmithKline Beecham Corporation
 - (B) STREET: 709 Swedeland Road
 - (C) CITY: King of Prussia
 - (D) STATE: PA
 - (E) COUNTRY: USA
 - (F) ZIP: 19406-2799
- (v) COMPUTER READABLE FORM:
 - (A) MEDIUM TYPE: Floppy disk
 - (B) COMPUTER: IBM PC compatible
 - (C) OPERATING SYSTEM: PC-DOS/MS-DOS
 - (D) SOFTWARE: PatentIn Release #1.0, Version #1.30
- (vi) CURRENT APPLICATION DATA:
 - (A) APPLICATION NUMBER: GB
 - (B) FILING DATE:
 - (C) CLASSIFICATION:
- (viii) ATTORNEY/AGENT INFORMATION:
 - (A) NAME: King, William T.
 - (B) REGISTRATION NUMBER: 30,954
 - (C) REFERENCE/DOCKET NUMBER: #
- (ix) TELECOMMUNICATION INFORMATION:
 - (A) TELEPHONE: 610-270-4800
 - (B) TELEFAX: 610-270-4026

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:1:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 336 base pairs
 - (B) TYPE: nucleic acid
 - (C) STRANDEDNESS: double
 - (D) TOPOLOGY: unknown
- (ii) MOLECULE TYPE: cDNA
- (ix) FEATURE:
 - (A) NAME/KEY: CDS
 - (B) LOCATION: 1..336
- (xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:1:

CAG	TCT	GTG	TTG	ACG	CAG	CCG	CCC	TCA	GTC	TCT	GCG	GCC	CCA	GGA	CAG	48
Gln	Ser	Val	Leu	Thr	Gln	Pro	Pro	Ser	Val	Ser	Ala	Ala	Pro	Gly	Gln	
1					5				10					15		
AAG	GTC	ACC	ATC	TCC	TGC	ACT	GGG	AGC	AGC	TCC	AAC	CTC	GGG	GCA	GGT	96

Lys	Val	Thr	Ile	Ser	Cys	Thr	Gly	Ser	Ser	Ser	Asn	Leu	Gly	Ala	Gly		
			20					25					30				
TAT	GAT	GTT	CAC	TGG	TAC	CGG	CAA	CTT	CCA	GGG	ACA	GCC	CCC	AAA	CTC	144	
Tyr	Asp	Val	His	Trp	Tyr	Arg	Gln	Leu	Pro	Gly	Thr	Ala	Pro	Lys	Leu		
		35					40					45					
CTC	ATC	TAT	GAT	AAC	AAC	AAT	CGG	CCC	TCA	GGG	GTC	CCT	GAC	CGA	TTC	192	
Leu	Ile	Tyr	Asp	Asn	Asn	Asn	Arg	Pro	Ser	Gly	Val	Pro	Asp	Arg	Phe		
		50				55					60						
TCT	GGC	TCC	AAG	TCT	GGC	CCC	TCA	GCC	TCC	CTG	GCC	ATC	TCT	GGG	CTC	240	
Ser	Gly	Ser	Lys	Ser	Gly	Pro	Ser	Ala	Ser	Leu	Ala	Ile	Ser	Gly	Leu		
		65			70					75				80			
CAG	GCT	GAG	GAT	GAG	GCT	GAT	TAT	TAC	TGC	CAG	TCC	TAT	GAC	AGC	AGC	288	
Gln	Ala	Glu	Asp	Glu	Ala	Asp	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Ser	Tyr	Asp	Ser	Ser		
			85					90					95				
CTG	AAT	GGT	TAT	GTC	TTC	GGA	ACT	GGG	ACC	CAG	CTC	ACC	GTC	CTA	GGT	336	
Leu	Asn	Gly	Tyr	Val	Phe	Gly	Thr	Gly	Thr	Gln	Leu	Thr	Val	Leu	Gly		
		100					105					110					

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:2:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 112 amino acids
 (B) TYPE: amino acid
 (D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:2:

Gln	Ser	Val	Leu	Thr	Gln	Pro	Pro	Ser	Val	Ser	Ala	Ala	Pro	Gly	Gln		
1				5				10					15				
Lys	Val	Thr	Ile	Ser	Cys	Thr	Gly	Ser	Ser	Ser	Asn	Leu	Gly	Ala	Gly		
		20					25					30					
Tyr	Asp	Val	His	Trp	Tyr	Arg	Gln	Leu	Pro	Gly	Thr	Ala	Pro	Lys	Leu		
		35				40					45						
Leu	Ile	Tyr	Asp	Asn	Asn	Asn	Arg	Pro	Ser	Gly	Val	Pro	Asp	Arg	Phe		
		50				55					60						
Ser	Gly	Ser	Lys	Ser	Gly	Pro	Ser	Ala	Ser	Leu	Ala	Ile	Ser	Gly	Leu		
		65			70					75				80			
Gln	Ala	Glu	Asp	Glu	Ala	Asp	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Ser	Tyr	Asp	Ser	Ser		
			85					90					95				
Leu	Asn	Gly	Tyr	Val	Phe	Gly	Thr	Gly	Thr	Gln	Leu	Thr	Val	Leu	Gly		
		100					105					110					

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:3:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 357 base pairs
 (B) TYPE: nucleic acid
 (C) STRANDEDNESS: double

(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(ix) FEATURE:

(A) NAME/KEY: CDS

(B) LOCATION: 1..357

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:3:

```
GAG GTG CAG CTG GTG GAG TCT GGG GGA GGC TTG GTA CAG CCT GGG GGG      48
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
  1          5          10          15

TCC CTG AGA CTC TCC TGC GCA GCC TCT GGA GTC TCC CTC AGT GGA TAC      96
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu Ser Gly Tyr
          20          25          30

AAG ATG AAC TGG GTC CGC CAG GCT CCA GGG AAG GGG CTG GAA TGG GTC     144
Lys Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
          35          40          45

TCT TCC ATT ACT GGT ATG AGT AAT TAC ATA CAC TAC TCA GAC TCA GTG     192
Ser Ser Ile Thr Gly Met Ser Asn Tyr Ile His Tyr Ser Asp Ser Val
          50          55          60

AAG GGC CGA TTC ACC ATC TCC AGA GAC AAC GCC ATG AAC TCA CTG TAT     240
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Met Asn Ser Leu Tyr
          65          70          75          80

CTG CAA ATG AAC AGC CTG ACA GCC GAG GAC ACG GGT GTT TAT TAT TGT     288
Leu Gln Met Asn Ser Leu Thr Ala Glu Asp Thr Gly Val Tyr Tyr Cys
          85          90          95

GCG ACA CAA CCG GGG GAG CTG GCG CCT TTT GAC CAT TGG GGC CAG GGA     336
Ala Thr Gln Pro Gly Glu Leu Ala Pro Phe Asp His Trp Gly Gln Gly
          100          105          110

ACC CTG GTC ACC GTC TCC TCA
Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
          115
```

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:4:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:

(A) LENGTH: 119 amino acids

(B) TYPE: amino acid

(D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:4:

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
  1          5          10          15

Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu Ser Gly Tyr
          20          25          30

Lys Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
```


(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:6:

```
Glu Val Gln Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
1           5           10           15
Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr
20           25           30
Glu Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Val
35           40           45
Ser Tyr Ile Ser Ser Ser Gly Ser Thr Ile Tyr Tyr Ala Asp Ser Val
50           55           60
Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Ser Leu Tyr
65           70           75           80
Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys
85           90           95
Ala Arg
```

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:7:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 138 amino acids
(B) TYPE: amino acid
(C) STRANDEDNESS:
(D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:7:

```
Met Gly Trp Ser Cys Ile Ile Leu Phe Leu Val Ala Thr Ala Thr Gly
1           5           10           15
Val His Ser Glu Val Gln Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln
20           25           30
Pro Gly Gly Ser Leu Arg Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Val Ser Leu
35           40           45
Ser Gly Tyr Lys Met Asn Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu
50           55           60
Glu Trp Val Ser Ser Ile Thr Gly Met Ser Asn Tyr Ile His Tyr Ser
65           70           75           80
Asp Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Met Asn
85           90           95
Ser Leu Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Thr Ala Glu Asp Thr Gly Val
```

	100		105		110										
Tyr	Tyr	Cys	Ala	Thr	Gln	Pro	Gly	Glu	Leu	Ala	Pro	Phe	Asp	His	Trp
	115						120					125			
Gly	Gln	Gly	Thr	Leu	Val	Thr	Val	Ser	Ser						
	130						135								

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:8:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 138 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: peptide

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:8:

Met	Gly	Trp	Ser	Cys	Ile	Ile	Leu	Phe	Leu	Val	Ala	Thr	Ala	Thr	Gly
1			5						10					15	
Val	His	Ser	Glu	Val	Gln	Leu	Val	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly	Leu	Val	Gln
		20						25					30		
Pro	Gly	Gly	Ser	Leu	Arg	Leu	Ser	Cys	Ala	Ala	Ser	Gly	Val	Ser	Leu
		35					40					45			
Ser	Gly	Tyr	Lys	Met	Asn	Trp	Val	Arg	Gln	Ala	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu
	50				55						60				
Glu	Trp	Val	Ser	Ser	Ile	Thr	Gly	Met	Ser	Asn	Tyr	Ile	His	Tyr	Ser
65					70					75				80	
Asp	Ser	Val	Lys	Gly	Arg	Phe	Thr	Ile	Ser	Arg	Asp	Asn	Ala	Met	Asn
			85						90					95	
Ser	Leu	Tyr	Leu	Gln	Met	Asn	Ser	Leu	Thr	Ala	Glu	Asp	Thr	Gly	Val
		100						105					110		
Tyr	Tyr	Cys	Ala	Thr	Gln	Pro	Gly	Glu	Leu	Ala	Pro	Phe	Asp	His	Trp
	115						120					125			
Gly	Gln	Gly	Thr	Leu	Val	Thr	Val	Ser	Ser						
	130						135								

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:9:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 111 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:9:

Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Ala Ala Pro Gly Gln
1 5 10 15
Lys Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Leu Gly Ala Gly
20 25 30
Tyr Asp Val His Trp Tyr Arg Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu
35 40 45
Leu Ile Tyr Asp Asn Asn Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe
50 55 60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Pro Ser Ala Ser Leu Ala Ile Ser Gly Leu
65 70 75 80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser Ser
85 90 95
Leu Asn Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Gln Leu Thr Val Leu
100 105 110

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:10:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 90 amino acids
(B) TYPE: amino acid
(C) STRANDEDNESS:
(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:10:

Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly Gln
1 5 10 15
Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala Gly
20 25 30
Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys Leu
35 40 45
Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe
50 55 60
Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly Leu
65 70 75 80
Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys
85 90

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:11:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 128 amino acids
(B) TYPE: amino acid
(C) STRANDEDNESS:
(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:11:

```
Met Gly Trp Ser Cys Ile Ile Leu Phe Leu Val Ala Thr Ala Thr Gly
 1           5           10           15
Val His Ser Glu Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala Pro Gly
          20           25           30
Gln Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile Gly Ala
          35           40           45
Gly Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala Pro Lys
          50           55           60
Leu Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro Asp Arg
          65           70           75           80
Phe Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile Thr Gly
          85           90           95
Leu Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr Asp Ser
          100          105          110
Ser Leu Asn Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Gln Leu Thr Val Leu
          115          120          125
```

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:12:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 130 amino acids
(B) TYPE: amino acid
(C) STRANDEDNESS:
(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:12:

```
Met Gly Trp Ser Cys Ile Ile Leu Phe Leu Val Ala Thr Ala Thr Gly
 1           5           10           15
Val His Ser Gln Ser Val Leu Thr Gln Pro Pro Ser Val Ser Gly Ala
          20           25           30
Pro Gly Gln Arg Val Thr Ile Ser Cys Thr Gly Ser Ser Ser Asn Ile
          35           40           45
Gly Ala Gly Tyr Asp Val His Trp Tyr Gln Gln Leu Pro Gly Thr Ala
          50           55           60
Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Gly Asn Ser Asn Arg Pro Ser Gly Val Pro
          65           70           75           80
```

Asp Arg Phe Ser Gly Ser Lys Ser Gly Thr Ser Ala Ser Leu Ala Ile
 85 90 95
 Thr Gly Leu Gln Ala Glu Asp Glu Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Ser Tyr
 100 105 110
 Asp Ser Ser Leu Asn Gly Tyr Val Phe Gly Thr Gly Thr Gln Leu Thr
 115 120 125
 Val Leu
 130

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:13:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 6281 base pairs
 (B) TYPE: nucleic acid
 (C) STRANDEDNESS: double
 (D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:13:

GACGTCGCGG CCGCTCTAGG CCTCCAAAAA AGCCTCCTCA CTACTTCTGG AATAGCTCAG	60
AGGCCGAGGC GGCCTCGGCC TCTGCATAAA TAAAAAAAT TAGTCAGCCA TGCATGGGGC	120
GGAGAATGGG CGGAACTGGG CGGAGTTAGG GCGGGGATGG GCGGAGTTAG GGGCGGGACT	180
ATGTTTGTCTG ACTAATTGAG ATGCATGCTT TGCATACTTC TGCCTGCTGG GGAGCCTGGG	240
GACTTTCCAC ACCTGGTTGC TGACTAATTG AGATGCATGC TTTGCATACT TCTGCCTGCT	300
GGGGAGCCTG GGGACTTTCC ACACCCTAAC TGACACACAT TCCACAGAAT TAATTCCCGG	360
GGATCGATCC GTCGACGTAC GACTAGTTAT TAATAGTAAT CAATTACGGG GTCATTAGTT	420
CATAGCCCAT ATATGGAGTT CCGCGTTACA TAACTTACGG TAAATGGCCC GCCTGGCTGA	480
CCGCCCAACG ACCCCCGCCC ATTGACGTCA ATAATGACGT ATGTTCCCAT AGTAACGCCA	540
ATAGGGACTT TCCATGACG TCAATGGGTG GACTATTTAC GSTAAACTGC CCACTTGGCA	600
GTACATCAAG TGTATCATAT GCCAAGTACG CCCCTATTG ACGTCAATGA CGGTAAATGG	660
CCCGCCTGGC ATTATGCCCC GTACATGACC TTATGGGACT TTCCTACTTG GCAGTACATC	720
TACGTATTAG TCATCGCTAT TACCATGGTG ATGCGGTTTT GGCAGTACAT CAATGGGCGT	780
GGATAGCGGT TTGACTCAGG GGGATTTCCA AGTCTCCACC CCATTGACGT CAATGGGAGT	840
TTGTTTTGGC ACCAAAATCA ACGGGACTTT CCAAAATGTC GTAACAACTC CGCCCCATTG	900
ACGCAAATGG GCGGTAGGCG TGTACGGTGG GAGGTCTATA TAAGCAGAGC TGGGTACGTG	960
AACCGTCAGA TCGCCTGGAG ACGCCATCGA ATTCTGAGCA CACAGGACCT CACCATGGGA	1020
TGGAGCTGTA TCATCCTCTT CTTGGTAGCA ACAGCTACAG GTGTCCACTC CGAGGTCCAA	1080

CTGCTCGAGT CTGGGGGAGG CTTGGTACAG CCTGGGGGGT CCCTGAGACT CTCCTGCGCA	1140
GCCTCTGGAG TCTCCCTCAG TGGATACAAG ATGAACTGGG TCCGCCAGGC TCCAGGGAAG	1200
GGGCTGGAAT GGGTCTCTTC CATTACTGGT ATGAGTAATT ACATACACTA CTCAGACTCA	1260
GTGAAGGGCC GATTCAACAT CTCCAGAGAC AACGCCATGA ACTCACTGTA TCTGCAAATG	1320
AACAGCCTGA CAGCCGAGGA CACGGGTGTT TATTATTGTG CGACACAACC GGGGGAGCTG	1380
GCGCCTTTTG ACCATTGGGG CCAGGGAACC CTGGTCACCG TCTCCTCAGC CTCCACCAAG	1440
GGCCCATCGG TCTTCCCCCT GGCACCTCC TCCAAGAGCA CCTCTGGGGG CACAGCGGCC	1500
CTGGGGTGCC TGGTCAAGGA CTACTTCCCC GAACCGGTGA CGGTGTCTGT GAACTCAGGC	1560
GCCCTGACCA GCGGGGTGCA CACCTTCCCG GCTGTCTAC AGTCCTCAGG ACTCTACTCC	1620
CTCAGCAGCG TGGTGACCGT GCCCTCCAGC AGCTTGGGCA CCCAGACCTA CATCTGCAAC	1680
GTGAATCACA AGCCCAGCAA CACCAAGGTG GACAAGAAAG TTGAGCCCAA ATCTTGTGAC	1740
AAAATCACA CATGCCCACC GTGCCAGCA CCTGAACTCC TGGGGGGACC GTCAGTCTTC	1800
CTCTTCCCCC CAAAACCCAA GGACACCTC ATGATCTCCC GGACCCCTGA GGTACATGC	1860
GTGGTGGTGG ACGTGAGCCA CGAAGACCTT GAGGTCAAGT TCAACTGGTA CGTGGACGGC	1920
GTGGAGGTGC ATAATGCCAA GACAAAGCCG CGGGAGGAGC AGTACAACAG CACGTACCGG	1980
GTGGTCAGCG TCCTCACCGT CCTGCACCAG GACTGGCTGA ATGGCAAGGA GTACAAGTGC	2040
AAGGTCTCCA ACAAAGCCCT CCCAGCCCC ATCGAGAAAA CCATCTCCA AGCCAAAGGG	2100
CAGCCCCGAG AACCACAGGT GTACACCCTG CCCCCATCCC GGGATGAGCT GACCAAGAAC	2160
CAGGTCAAGC TGACCTGCCT GGTCAAAGGC TTCTATCCCA GCGACATCGC CGTGGAGTGG	2220
GAGAGCAATG GGCAGCCGGA GAACAACTAC AAGACCAGC CTCCCGTGCT GGACTCCGAC	2280
GGCTCCTTCT TCCTCTACAG CAAGCTCACC GTGGACAAGA GCAGGTGGCA GCAGGGGAAC	2340
GTCTTCTCAT GCTCCGTGAT GCATGAGGCT CTGCACAACC ACTACACGCA GAAGAGCCTC	2400
TCCTGTCTC CGGGTAAATG ATAGATATCT ACGTATGATC AGCCTCGACT GTGCCTTCTA	2460
GTGGCCAGCC ATCTGTTGTT TGCCCTCCC CCGTGCTTC CTTGACCCTG GAAGGTGCCA	2520
CTCCCACTGT CCTTTCCTAA TAAATGAGG AAATTGCATC GCATTGTCTG AGTAGGTGTC	2580
ATTCTATTCT GGGGGGTGGG GTGGGGCAGG ACAGCAAGGG GGAGGATTGG GAAGACAATA	2640
GCAGGCATGC TGGGGATGCG GTGGGCTCTA TGGAAACCAGC TGGGGCTCGA CAGCGCTGGA	2700
TCTCCCGATC CCCAGCTTTG CTTCTCAATT TCTTATTTGC ATAATGAGAA AAAAAGGAAA	2760
ATTAATTTTA ACACCAATTC AGTAGTTGAT TGAGCAAATG CGTTGCCAAA AAGGATGCTT	2820
TAGAGACAGT GTTCTCTGCA CAGATAAGGA CAAACATTAT TCAGAGGGAG TACCCAGAGC	2880
TGAGACTCCT AAGCCAGTGA GTGGCACAGC ATTCTAGGGA GAAATATGCT TGTTCATCACC	2940
GAAGCCTGAT TCCGTAGAGC CACACCTTGG TAAGGGCCAA TCTGCTCACA CAGGATAGAG	3000

AGGGCAGGAG	CCAGGGCAGA	GCATATAAGG	TGAGGTAGGA	TCAGTTGCTC	CTCACATTTG	3060
CTTCTGACAT	AGTTGTGTTG	GGAGCTTGGA	TAGCTTGGAC	AGCTCAGGGC	TGCGATTTCG	3120
CGCCAAACTT	GACGGCAATC	CTAGCGTGAA	GGCTGGTAGG	ATTTTATCCC	CGCTGCCATC	3180
ATGGTTCGAC	CATTGAACTG	CATCGTCGCC	GTGTCCCAAA	ATATGGGGAT	TGGCAAGAAC	3240
GGAGACCTAC	CCTGGCCTCC	GCTCAGGAAC	GAGTTCAAGT	ACTTCCAAAG	AATGACCACA	3300
ACCTCTTCAG	TGGAAGGTAA	ACAGAATCTG	GTGATTATGG	GTAGGAAAAC	CTGGTTCTCC	3360
ATTCTGAGA	AGAATCGACC	TTTAAAGGAC	AGAATTAATA	TAGTTCTCAG	TAGAGAACTC	3420
AAAGAACCAC	CACGAGGAGC	TCATTTTCTT	GCCAAAAGTT	TGGATGATGC	CTTAAGACTT	3480
ATTGAACAAC	CGGAATTGGC	AAGTAAAGTA	GACATGGTTT	GGATAGTCGG	AGGCAGTTCT	3540
GTTTACCAGG	AAGCCATGAA	TCAACCAGGC	CACCTTAGAC	TCTTTGTGAC	AAGGATCATG	3600
CAGGAATTTG	AAAGTGACAC	GTTTTTCCCA	GAAATTGATT	TGGGGAAATA	TAAACTTCTC	3660
CCAGAATACC	CAGGCGTCCT	CTCTGAGGTC	CAGGAGGAAA	AAGGCATCAA	GTATAAGTTT	3720
GAAGTCTACG	AGAAGAAAGA	CTAACAGGAA	GATGCTTTCA	AGTTCTCTGC	TCCCCTCCTA	3780
AAGCTATGCA	TTTTTATAAG	ACCATGGGAC	TTTTGCTGGC	TTTAGATCAG	CCTCGACTGT	3840
GCCTTCTAGT	TGCCAGCCAT	CTGTTGTTTG	CCCCTCCCCC	GTGCCTTCCT	TGACCCTGGA	3900
AGGTGCCACT	CCCCTGTCC	TTTCCTAATA	AAATGAGGAA	ATTGCATCGC	ATTGTCTGAG	3960
TAGGTGTCTAT	TCTATTCCTG	GGGGTGGGGT	GGGGCAGGAC	AGCAAGGGGG	AGGATTGGGA	4020
AGACAATAGC	AGGCATGCTG	GGGATGCGGT	GGGCTCTATG	GAACCAGCTG	GGGCTCGATC	4080
GAGTGTATGA	CTGGCGCCGC	GATCCCGTCG	AGAGCTTGGC	GTAATCATGG	TCATAGCTGT	4140
TTCTGTGTG	AAATTGTTAT	CCGCTCACAA	TTCCACACAA	CATACGAGCC	GGAAGCATAA	4200
AGTGTAAGC	CTGGGGTGCC	TAATGAGTGA	GCTAACTCAC	ATTAATTGCG	TGCGCTCAC	4260
TGCCCCTTTT	CCAGTCGGGA	AACCTGTCGT	GCCAGCTGCA	TTAATGAATC	GGCCAACGCG	4320
CGGGGAGAGG	CGGTTTGCGT	ATTGGGCGCT	CTCCGCTTC	CTCGCTCACT	GACTCGCTGC	4380
GCTCGGTGCT	TGGCTGCGG	CGAGCGGTAT	CAGCTCACTC	AAAGGCGGTA	ATACGGTTAT	4440
CCACAGAATC	AGGGGATAAC	GCAGGAAAGA	ACATGTGAGC	AAAAGGCCAG	CAAAAGGCCA	4500
GGAACCGTAA	AAAGGCCCGG	TTGCTGGCGT	TTTCCATAG	GCTCCGCCCC	CCTGACGAGC	4560
ATCACAAAAA	TCGACGCTCA	AGTCAGAGGT	GGCGAAACCC	GACAGGACTA	TAAAGATACC	4620
AGGCGTTTCC	CCCTGGAAGC	TCCCTCGTGC	GCTCTCCTGT	TCCGACCCCTG	CCGCTTACCG	4680
GATACCTGTC	CGCCTTTCTC	CCTTCGGGAA	GCGTGGCGCT	TTCTCAATGC	TCACGCTGTA	4740
GGTATCTCAG	TTCGGTGTAG	GTCGTTTCGCT	CCAAGCTGGG	CTGTGTGCAC	GAACCCCCCG	4800
TTCAGCCCCG	CCGCTGCGCC	TTATCCGGTA	ACTATCGTCT	TGAGTCCAAC	CCGGTAAGAC	4860

ACGACTTATC GCCACTGGCA GCAGCCACTG GTAACAGGAT TAGCAGAGCG AGGTATGTAG	4920
GCGGTGCTAC AGAGTTCTTG AAGTGGTGGC CTAACACGG CTACACTAGA AGGACAGTAT	4980
TTGGTATCTG CGCTCTGCTG AAGCCAGTTA CCTTCGGAAA AAGAGTTGGT AGCTCTTGAT	5040
CCGGCAAAACA AACCACCGCT GGTAGCGGTG GTTTTTTTGT TTGCAAGCAG CAGATTACGC	5100
GCAGAAAAAA AGGATCTCAA GAAGATCCTT TGATCTTTTC TACGGGGTCT GACGCTCAGT	5160
GGAACGAAAA CTCACGTAA GGGATTTTGG TCATGAGATT ATCAAAAAGG ATCTTCACCT	5220
AGATCCTTTT AAATTAAAA TGAAGTTTAA AATCAATCTA AAGTATATAT GAGTAAACTT	5280
GGTCTGACAG TTACCAATGC TTAATCAGTG AGGCACCTAT CTCAGCGATC TGTCTATTTC	5340
GTTCAATCCAT AGTTGCCTGA CTCCCCGTG TGTAGATAAC TACGATACGG GAGGGCTTAC	5400
CATCTGGCCC CAGTGTGCA ATGATACCGC GAGACCCACG CTCACCGGCT CCAGATTTAT	5460
CAGCAATAAA CCAGCCAGCC GGAAGGGCCG AGCGCAGAAG TGGTCCTGCA ACTTTATCCG	5520
CCTCCATCCA GTCTATTAAT TGTGCGGGG AAGCTAGAGT AAGTAGTTG CCAGTTAATA	5580
GTTTGCGCAA CGTTCTGCG ATTGCTACAG GCATCGTGGT GTCACGCTCG TCGTTTGTA	5640
TGGCTTCATT CAGCTCCGT TCCCAACGAT CAAGGCGAGT TACATGATCC CCCATGTTGT	5700
GCAAAAAAGC GGTTAGCTCC TTCGGTCTC CGATCGTTGT CAGAAGTAAG TTGGCCGCAG	5760
TGTTATCACT CATGGTTATG CCAGCACTGC ATAATTCTCT TACTGTCATG CCATCCGTAA	5820
GATGCTTTTC TGTGACTGGT GAGTACTCAA CCAAGTCATT CTGAGAATAG TGTATGCGGC	5880
GACCGACTTG CTCTTGCCCG GCGTCAATAC GGGATAATAC CGCGCCACAT AGCAGAACTT	5940
TAAAAGTGCT CATCATTTGA AAACGTTCTT CGGGGCGAAA ACTCTCAAGG ATCTTACCGC	6000
TGTTGAGATC CAGTTCGATG TAACCCACTC GTGCACCCAA CTGATCTTCA GCATCTTTTA	6060
CTTTCACCAG CGTTTCTGGG TGAGCAAAAA CAGGAAGGCA AAATGCCGCA AAAAAGGGAA	6120
TAAGGGCGAC ACGGAAATGT TGAATACTCA TACTCTTCCT TTTTCAATAT TATTGAAGCA	6180
TTTATCAGGG TTATTGTCTC ATGAGCGGAT ACATATTTGA ATGTATTTAG AAAAATAAAC	6240
AAATAGGGGT TCCGCGCACA TTTCCCCGAA AAGTGCCACC T	6281

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:14:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 5679 base pairs
 - (B) TYPE: nucleic acid
 - (C) STRANDEDNESS: double
 - (D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:14:

GACGTCGCGG CCGCTCTAGG CCTCCAAAAA AGCCTCCTCA CTACTTCTGG AATAGCTCAG	60
AGGCCGAGGC GGCCTCGGCC TCTGCATAAA TAAAAAAAT TAGTCAGCCA TGCATGGGGC	120
GGAGAATGGG CGGAAGTGGG CGGAGTTAGG GCGGGGATGG GCGGAGTTAG GGGCGGGACT	180
ATGGTTGCTG ACTAATTGAG ATGCATGCTT TGCATACTTC TGCCTGCTGG GGAGCCTGGG	240
GACTTTCCAC ACCTGGTTGC TGACTAATTG AGATGCATGC TTTGCATACT TCTGCCTGCT	300
GGGGAGCCTG GGGACTTTCC ACACCCTAAC TGACACACAT TCCACAGAAT TAATTCCCGG	360
GGATCGATCC GTCGACGTAC GACTAGTTAT TAATAGTAAT CAATTACGGG GTCATTAGTT	420
CATAGCCCAT ATATGGAGTT CCGCGTTACA TAAGTTACGG TAAATGGCCC GCCTGGCTGA	480
CCGCCAACG ACCCCCGCCC ATTGACGTCA ATAATGACGT ATGTTCCCAT AGTAACGCCA	540
ATAGGGACTT TCCATTGACG TCAATGGGTG GACTATTTAC GGTAAACTGC CCACTTGGCA	600
GTACATCAAG TGTATCATAT GCCAAGTACG CCCCCTATTG ACGTCAATGA CGGTAAATGG	660
CCCGCCTGGC ATTATGCCCC GTACATGACC TTATGGGACT TTCTACTTG GCAGTACATC	720
TACGTATTAG TCATCCCTAT TACCATGGTG ATGCGGTTTT GGCAGTACAT CAATGGGCGT	780
GGATAGCGGT TTGACTCAGG GGGATTTCCA AGTCTCCACC CCATTGACGT CAATGGGAGT	840
TTGTTTTGGC ACCAAATCA ACGGGACTTT CCAAATGTC GTAACAACTC CGCCCCATTG	900
ACGCAAATGG GCGGTAGGCG TGTACGGTGG GAGGTCTATA TAAGCAGAGC TGGGTACGTG	960
AACCGTCAGA TCGCCTGGAG ACGCCATCGA ATTCTGAGCA CACAGGACCT CACCATGGGA	1020
TGGAGCTGTA TCATCCTCTT CTTGGTAGCA ACAGCTACAG GTGTCCACTC CGAGCTCAGC	1080
CAGCCGCCCT CAGTCTCTGC GGCCCCAGGA CAGAAGGTCA CCATCTCCTG CACTGGGAGC	1140
AGCTCCAACC TCGGGGCAGG TTATGATGTT CACTGGTACC GGCAACTTCC AGGGACAGCC	1200
CCCAAACCTC TCATCTATGA TAACAACAAT CCGCCCTCAG GGGTCCCTGA CCGATTCTCT	1260
GGCTCCAAGT CTGGCCCCTC AGCCTCCCTG GCCATCTCTG GGCTCCAGGC TGAGGATGAG	1320
GCTGATTATT ACTGCCAGTC CTATGACAGC AGCCTGAATG GTTATGTCTT CGGAAC TGGG	1380
ACCCAGCTCA CCGTCCTAGG TCAGCCCAAG GCTGCCCCCT CGGTCACTCT GTTCCCGCCC	1440
TCCTCTGAGG AGCTTCAAGC CAACAAGGCC ACACTGGTGT GTCTCATAAG TGACTTCTAC	1500
CCGGGAGCCG TGACAGTGGC CTGGAAGGCA ATTAGCAGCC CCGTCAAGGC GGGAGTGGAG	1560
ACCACCACAC CCTCCAAACA AAGCAACAAC AAGTACGCGG CCAGCAGCTA TCTGAGCCTG	1620
ACGCCTGAGC AGTGGAGTC CCACAGAAGG TACAGCTGCC AGGTCAAGCA TGAAGGGAGC	1680
ACCGTGGAGA AGACAGTGGC CCCTACAGAA TGTTCATAGT TCTAGATCTA CGTATGATCA	1740
GCCTCGACTG TGCCTTCTAG TTGCCAGCCA TCTGTTGTTT GCCCCCCCCC CGTGCTTCC	1800
TTGACCCTGG AAGGTGCCAC TCCCACTGTC CTTTCCTAAT AAAATGAGGA AATTGCATCG	1860
CATTGTCTGA GTAGGTGTCA TTCTATTCTG GGGGGTGGGG TGGGGCAGGA CAGCAAGGGG	1920

GAGGATTGGG AAGACAATAG CAGGCATGCT GGGGATGCCG TGGGCTCTAT GGAACCAGCT	1980
GGGGCTCGAC AGCTCGAGCT AGCTTTGCTT CTCAATTTCT TATTTCATA ATGAGAAAAA	2040
AAGGAAAATT AATTTTAACA CCAATTCAGT AGTTGATTGA GCAAATGCGT TGCCAAAAAG	2100
GATGCTTTAG AGACAGTGTT CTCTGCACAG ATAAGGACAA ACATTATTCA GAGGGAGTAC	2160
CCAGAGCTGA GACTCCTAAG CCAGTGAGTG GCACAGCATT CTAGGGAGAA ATATGCTTGT	2220
CATCACCGAA GCCTGATTCC GTAGAGCCAC ACCTTGGTAA GGGCCAATCT GCTCACACAG	2280
GATAGAGAGG GCAGGAGCCA GGGCAGAGCA TATAAGGTGA GGTAGGATCA GTTGCTCCTC	2340
ACATTGCTT CTGACATAGT TGTGTTGGGA GCTTGGATCG ATCCACCATG GTTGAACAAG	2400
ATGGATTGCA CCGAGGTTCT CCGGCCGCTT GGGTGGAGAG GCTATTCCGC TATGACTGGG	2460
CACAACAGAC AATCGGCTGC TCTGATGCCG CCGTGTTCG GCTGTCAGCG CAGGGGCGCC	2520
CGGTTCTTTT TGTCGAAGACC GACCTGTCCG GTGCCCTGAA TGAAGTGCAG GACGAGGCAG	2580
CGCGCTATC GTGGCTGGCC ACGACGGGCG TTCCTTGCGC AGCTGTGCTC GACGTTGTCA	2640
CTGAAGCGGG AAGGGAAGTG CTGCTATTGG GCGAAGTGCC GGGGCAGGAT CTCCTGTCAT	2700
CTCACCTTGC TCCTGCCGAG AAAGTATCCA TCATGGCTGA TGCAATGCGG CGGCTGCATA	2760
CGCTTGATCC GGCTACCTGC CCATTCGACC ACCAAGCGAA ACATCGCATC GAGCGAGCAC	2820
GTACTCGGAT GGAAGCCGGT CTGTGTCATC AGGATGATCT GGACGAAGAG CATCAGGGGC	2880
TGCGGCCAGC CGAACTGTTC GCCAGGCTCA AGGCGCGCAT GCCCGACGGC GAGGATCTCG	2940
TGCTGACCCA TGGCGATGCC TGCTTGCCGA ATATCATGGT GGAAAAATGGC CGCTTTTCTG	3000
GATTCATCGA CTGTGGCCGG CTGGGTGTGG CGGACCGCTA TCAGGACATA GCGTTGGCTA	3060
CCCGTGATAT TGCTGAAGAG CTGTGGCGCG AATGGGCTGA CCGCTTCCTC GTGCTTTACG	3120
GTATCGCCGC TCCCGATTGG CAGCGCATCG CCTTCTATCG CCTTCTTGAC GAGTTCCTCT	3180
GAGCGGGACT CTGGGGTTGG AAATGACCGA CCAAGCGACG CCCAACCTGC CATCAGGAGA	3240
TTTCGATTCC ACCGCCGCTT TCTATGAAAG GTTGGGCTTC GGAATCGTTT TCCGGGACGC	3300
CGGCTGGATG ATCCTCCAGC GCGGGGATCT CATGCTGGAG TTCTTCGCCC ACCCCAATT	3360
GTTTATTGCA GCTTATAATG GTTACAAATA AAGCAATAGC ATCACAAATT TCACAAATAA	3420
AGCATTTTTT TCACTGCATT CTAGTTGTGG TTTGTCCAAA CTCATCAATG TATCTTATCA	3480
TGTCTGGATC GCGCCCGGA TCCCGTCGAG AGCTTGGCGT AATCATGGTC ATAGCTGTTT	3540
CCTGTGTGAA ATTGTTATCC GCTCACAATT CCACACAACA TACGAGCCGG AAGCATAAAG	3600
TGTAAAGCCT GGGGTGCCTA ATGAGTGAGC TAACTCACAT TAATTGCGTT GCGTCACTG	3660
CCCGCTTTCC AGTCGGGAAA CCTGTGCTGC CAGCTGCATT AATGAATCGG CCAACGCGCG	3720
GGGAGAGGCG GTTTCGTAT TGGGCGCTCT TCCGCTTCCT CGCTCACTGA CTCGCTGCGC	3780

TCGGTCGTTC GGCTGCGGCG AGCGGTATCA GCTCACTCAA AGGCGGTAAT ACGGTTATCC	3840
ACAGAATCAG GGGATAACGC AGGAAAGAAC ATGTGAGCAA AAGGCCAGCA AAAGGCCAGG	3900
AACCGTAAAA AGGCCGCGTT GCTGGCGTTT TTCCATAGGC TCCGCCCCC TGACGAGCAT	3960
CACAAAAATC GACGCTCAAG TCAGAGGTGG CGAAACCCGA CAGGACTATA AAGATACCAG	4020
GCGTTTCCCC CTGGAAGCTC CCTCGTGGCG TCTCCTGTTC CGACCCTGCC GCTTACCGGA	4080
TACCTGTCCG CTTTCTCCCC TTCGGGAAGC GTGGCGCTTT CTCAATGCTC ACGCTGTAGG	4140
TATCTCAGTT CGGTGTAGGT CGTTCGCTCC AAGCTGGGCT GTGTGCACGA ACCCCCCGTT	4200
CAGCCCGACC GCTGCGCCTT ATCCGGTAAC TATCGTCTTG ACTCCAACCC GGTAAGACAC	4260
GACTTATCGC CACTGGCAGC AGCCACTGGT AACAGGATTA GCAGAGCGAG GTATGTAGGC	4320
GGTGCTACAG AGTTCTTGAA GTGGTGGCCT AACTACGGCT AACTAGAAAG GACAGTATTT	4380
GGTATCTGCG CTCTGCTGAA GCCAGTTACC TTCGGAAAAA GAGTTGGTAG CTCTTGATCC	4440
GGCAAAACAA CCACCGCTGG TAGCGGTGGT TTTTTTGTTC GCAAGCAGCA GATTACGCGC	4500
AGAAAAAAG GATCTCAAGA AGATCCTTTG ATCTTTTCTA CGGGGTCTGA CGCTCAGTGG	4560
AACGAAACT CACGTTAAGG GATTTTGGTC ATGAGATTAT CAAAAGGAT CTTCACCTAG	4620
ATCCTTTTAA ATTAAAAATG AAGTTTAA TCAATCTAAA GTATATATGA GTAAACTTGG	4680
TCTGACAGTT ACCAATGCTT AATCAGTGAG GCACCTATCT CAGCGATCTG TCTATTTCTG	4740
TCATCCATAG TTGCTGACT CCCCCTCGTG TAGATAACTA CGATACGGGA GGGCTTACCA	4800
TCTGGCCCCA GTGCTGCAAT GATACCGCGA GACCCACGCT CACCGGCTCC AGATTATCA	4860
GCAATAAACC AGCCAGCCGG AAGGGCCGAG CGCAGAAGTG GTCTTGCAAC TTTATCCGCC	4920
TCCATCCAGT CTATTAAATTG TTGCCGGGAA GCTAGAGTAA GTACTTCGCC AGTTAATAGT	4980
TTGCGCAACG TTGTTGCCAT TGCTACAGGC ATCGTGGTGT CACGCTCGTC GTTTGGTATG	5040
GCTTCATTCA GCTCCGGTTC CCAACGATCA AGGCGAGTTA CATGATCCCC CATGTTGTGC	5100
AAAAAAGCGG TTAGCTCCTT CGGTCTCCG ATCGTTGTCA GAAGTAAGTT GGCCGCAGTG	5160
TTATCACTCA TGGTTATGGC AGCACTGCAT AATTCTCTTA CTGTATGCC ATCCGTAAGA	5220
TGCTTTTCTG TGACTGGTGA GTACTCAACC AAGTCATTCT GAGAATAGTG TATGCGCGCA	5280
CCGAGTTGCT CTTGCCCGGC GTCAATACGG GATAATACCG CGCCACATAG CAGAACTTTA	5340
AAAGTGCTCA TCATTGAAA ACGTTCTTCG GGGCGAAAAC TCTCAAGGAT CTTACCGCTG	5400
TTGAGATCCA GTTCGATGTA ACCCACTCGT GCACCCAACT GATCTTCAGC ATCTTTTACT	5460
TTCAACAGCG TTCTGGGTG AGCAAAAACA GGAAGGCAAA ATGCCGCAAA AAAGGGAATA	5520
AGGCGACAC GGAAATGTTG AATACTCATA CTCTTCCTTT TTCAATATTA TTGAAGCATT	5580
TATCAGGGTT ATTGTCTCAT GAGCGGATAC ATATTTGAAT GTATTTAGAA AAATAAACAA	5640
ATAGGGGTTC CGCGCACATT TCCCCGAAAA GTGCCACCT	5679

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:15:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 1442 base pairs
(B) TYPE: nucleic acid
(C) STRANDEDNESS: double
(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:15:

GAATTCTGAG CACACAGGAC CTCACCATGG GATGAGGCTG TATCATCCTC TTCTTGGTAG	60
CAACAGCTAC AGGTGTCCAC TCCGAGGTGC AGCTGGTGGA GTCTGGGGGA GGCTTGGTAC	120
AGCCTGGGGG GTCCCTGAGA CTCTCCTGCG CAGCCTCTGG AGTCTCCCTC AGTGGATACA	180
AGATGAACTG GGTCCGCCAG GCTCCAGGGA AGGGGCTGGA ATGGGTCTCT TCCATTACTG	240
GATGAGTAA TTACATACAC TACTCAGACT CAGTGAAGGG CCGATTACAC ATCTCCAGAG	300
ACAACGCCAT GAACCTACTG TATCTGCAA TGAACAGCCT GACAGCCGAG GACACGGGTG	360
TTTATTATTG TCGACACAA CCGGGGAGC TGGCGCCTTT TGACCATTGG GGCCAGGGAA	420
CCCTGGTCAC CGTCTCCTCA GCCTCCACCA AGGGCCCATC GGTCTTCCCC CTGGCACCCCT	480
CCTCCAAGAG CACCTCTGGG GGCACAGCGG CCCTGGGCTG CCTGGTCAAG GACTACTTCC	540
CCGAACCGGT GACGGTGTCT TGGAACTCAG GCGCCCTGAC CAGCGGCGTG CACACCTTCC	600
CGGCTGTCTT ACAGTCTCTA GGACTCTACT CCCTCAGCAG CGTGGTGACC GTGCCCTCCA	660
GCAGCTTGGG CACCCAGACC TACATCTGCA ACGTGAATCA CAAGCCCAGC AACACCAAGG	720
TGGACAAGAA AGTTGAGCCC AAATCTTGTG AAAAACTCA CACATGCCCA CCGTGCCGAG	780
CACCTGAACT CCTGGGGGGA CCGTCAGTCT TCCTCTTCCC CCCAAAACCC AAGGACACCC	840
TCATGATCTC CCGGACCCCT GAGGTCACAT GCGTGGTGGT GGACGTGAGC CACGAAGACC	900
CTGAGGTCAA GTTCAACTGG TACGTGGACG GCGTGGAGGT GCATAATGCC AAGACAAAGC	960
CGCGGGAGGA GCAGTACAAC AGCACGTACC GGGTGGTCAG CGTCTCACC GTCTGCACC	1020
AGGACTGGCT GAATGGCAAG GAGTACAAGT GCAAGGTCTC CAACAAAGCC CTCCCAGCCC	1080
CCATCGAGAA AACCATCTCC AAAGCCAAAG GGCAGCCCCG AGAACCACAG GTGTACACCC	1140
TGCCCCATC CCGGGATGAG CTGACCAAGA ACCAGGTCAG CCTGACCTGC CTGGTCAAAG	1200
GCTTCTATCC CAGCGACATC GCCGTGGAGT GGGAGAGCAA TGGGCAGCCG GAGAACAAC	1260
ACAAGACCAC GCCTCCCGTG CTGGACTCCG ACGGCTCCTT CTTCCTCTAC AGCAAGCTCA	1320
CCGTGGACAA GAGCAGGTGG CAGCAGGGGA ACGTCTTCTC ATGCTCCGTG ATGCATGAGG	1380
CTCTGCACAA CCACTACACG CAGAAGAGCC TCTCCCTGTC TCCGGGTAAA TGATAGATAT	1440

CT

1442

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:16:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 762 base pairs
(B) TYPE: nucleic acid
(C) STRANDEDNESS: double
(D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:16:

```
GAATTCTGAG CACACAGGAC CTCACCATGG GATGGAGCTG TATCATCCTC TTCTTGGTAG      60
CAACAGCTAC AGGTGTCCAC TCCCAGTCTG TGTTGACGCA GCCGCCCTCA GTCTCTGCGG      120
CCCCAGGACA GAAGGTCACC ATCTCCTGCA CTGGGAGCAG CTCCAACCTC GGGGCAGGTT      180
ATGATGTTC A CTGGTACCGG CAACTTCCAG GGACAGCCCC CAAACTCCTC ATCTATGATA      240
ACAACAATCG GCCCTCAGGG GTCCCTGACC GATTCTCTGG CTCCAAGTCT GGGCCCTCAG      300
CCTCCCTGGC CATCTCTGGG CTCCAGGCTG AGGATGAGGC TGATTATTAC TGCCAGTCTT      360
ATGACAGCAG CCTGAATGGT TATGTCTTCG GAACTGGGAC CCAGCTCACC GTCCTAGGTC      420
AGCCCAAGGC TGCCCCCTCG GTCACCTCTGT TCCCGCCCTC CTCTGAGGAG CTTCAAGCCA      480
ACAAGGCCAC ACTGGTCTGT CTCATAAGTG ACTTCTACCC GGGAGCCGTG ACAGTGGCCT      540
GGAAGGCAAT TAGCAGCCCC GTCAAGGCGG GAGTGGAGAC CACCACACCC TCCAAACAAA      600
GCAACAACAA GTACGCGGCC AGCAGCTATC TGAGCCTGAC GCCTGAGCAG TGGAAGTCCC      660
ACAGAAGGTA CAGCTGCCAG GTCACGCATG AAGGGAGCAC CGTGGAGAAG ACAGTGGCCC      720
CTACAGAATG TTCATAGTTC TAGATCTACG TATGATCAGC CT                                762
```

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:17:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
(A) LENGTH: 6 amino acids
(B) TYPE: amino acid
(C) STRANDEDNESS:
(D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: peptide

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:17:

```
Glu Val Gln Leu Leu Glu
1           5
```

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:18:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 6 amino acids
 (B) TYPE: amino acid
 (C) STRANDEDNESS:
 (D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: peptide

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:18:

Glu Val Gln Leu Val Glu
 1 5

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:19:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 1899 base pairs
 (B) TYPE: nucleic acid
 (C) STRANDEDNESS: double
 (D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: cDNA

(ix) FEATURE:
 (A) NAME/KEY: CDS
 (B) LOCATION: 14..1735

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:19:

GGGGCAAATA ACA ATG GAG TTG CTA ATC CTC AAA GCA AAT GCA ATT ACC	49
Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr	
1 5 10	
ACA ATC CTC ACT GCA GTC ACA TTT TGT TTT GCT TCT GGT CAA AAC ATC	97
Thr Ile Leu Thr Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile	
15 20 25	
ACT GAA GAA TTT TAT CAA TCA ACA TGC AGT GCA GTT AGC AAA GGC TAT	145
Thr Glu Glu Phe Tyr Gln Ser Thr Cys Ser Ala Val Ser Lys Gly Tyr	
30 35 40	
CTT AGT GCT CTG AGA ACT GGT TGG TAT ACC AGT GTT ATA ACT ATA GAA	193
Leu Ser Ala Leu Arg Thr Gly Trp Tyr Thr Ser Val Ile Thr Ile Glu	
45 50 55 60	
TTA AGT AAT ATC AAG GAA AAT AAG TGT AAT GGA ACA GAT GCT AAG GTA	241
Leu Ser Asn Ile Lys Glu Asn Lys Cys Asn Gly Thr Asp Ala Lys Val	
65 70 75	
AAA TTG ATA AAA CAA GAA TTA GAT AAA TAT AAA AAT GCT GTA ACA GAA	289
Lys Leu Ile Lys Gln Glu Leu Asp Lys Tyr Lys Asn Ala Val Thr Glu	
80 85 90	
TTG CAG TTG CTC ATG CAA AGC ACA CCA CCA ACA AAC AAT CGA GCC AGA	337
Leu Gln Leu Leu Met Gln Ser Thr Pro Pro Thr Asn Asn Arg Ala Arg	
95 100 105	

AGA GAA CTA CCA AGG TTT ATG AAT TAT ACA CTC AAC AAT GCC AAA AAA Arg Glu Leu Pro Arg Phe Met Asn Tyr Thr Leu Asn Asn Ala Lys Lys 110 115 120	385
ACC AAT GTA ACA TTA AGC AAG AAA AGG AAA AGA AGA TTT CTT GGT TTT Thr Asn Val Thr Leu Ser Lys Lys Arg Lys Arg Phe Leu Gly Phe 125 130 135 140	433
TTG TTA GGT GTT GGA TCT GCA ATC GCC AGT GGC GTT GCT GTA TCT AAG Leu Leu Gly Val Gly Ser Ala Ile Ala Ser Gly Val Ala Val Ser Lys 145 150 155	481
GTC CTG CAC CTA GAA GGG GAA GTG AAC AAG ATC AAA AGT GCT CTA CTA Val Leu His Leu Glu Gly Glu Val Asn Lys Ile Lys Ser Ala Leu Leu 160 165 170	529
TCC ACA AAC AAG GCT GTA GTC AGC TTA TCA AAT GGA GTT AGT GTC TTA Ser Thr Asn Lys Ala Val Val Ser Leu Ser Asn Gly Val Ser Val Leu 175 180 185	577
ACC AGC AAA GTG TTA GAC CTC AAA AAC TAT ATA GAT AAA CAA TTG TTA Thr Ser Lys Val Leu Asp Leu Lys Asn Tyr Ile Asp Lys Gln Leu Leu 190 195 200	625
CCT ATT GTG AAC AAG CAA AGC TGC AGC ATA TCA AAT ATA GAA ACT GTG Pro Ile Val Asn Lys Gln Ser Cys Ser Ile Ser Asn Ile Glu Thr Val 205 210 215 220	673
ATA GAG TTC CAA CAA AAG AAC AAC AGA CTA CTA GAG ATT ACC AGG GAA Ile Glu Phe Gln Gln Lys Asn Asn Arg Leu Leu Glu Ile Thr Arg Glu 225 230 235	721
TTT AGT GTT AAT GCA GGT GTA ACT ACA CCT CTA AGC ACT TAC ATG TTA Phe Ser Val Asn Ala Gly Val Thr Thr Pro Val Ser Thr Tyr Met Leu 240 245 250	769
ACT AAT AGT GAA TTA TTG TCA TTA ATC AAT GAT ATG CCT ATA ACA AAT Thr Asn Ser Glu Leu Leu Ser Leu Ile Asn Asp Met Pro Ile Thr Asn 255 260 265	817
GAT CAG AAA AAG TTA ATG TCC AAC AAT GTT CAA ATA GTT AGA CAG CAA Asp Gln Lys Lys Leu Met Ser Asn Asn Val Gln Ile Val Arg Gln Gln 270 275 280	865
AGT TAC TCT ATC ATG TCC ATA ATA AAA GAG GAA GTC TTA GCA TAT GTA Ser Tyr Ser Ile Met Ser Ile Ile Lys Glu Glu Val Leu Ala Tyr Val 285 290 295 300	913
GTA CAA TTA CCA CTA TAT GGT GTT ATA GAT ACA CCC TGT TGG AAA CTA Val Gln Leu Pro Leu Tyr Gly Val Ile Asp Thr Pro Cys Trp Lys Leu 305 310 315	961
CAC ACA TCC CCT CTA TGT ACA ACC AAC ACA AAA GAA GGG TCC AAC ATC His Thr Ser Pro Leu Cys Thr Thr Asn Thr Lys Glu Gly Ser Asn Ile 320 325 330	1009
TGT TTA ACA AGA ACT GAC AGA GGA TGG TAC TGT GAC AAT GCA GGA TCA Cys Leu Thr Arg Thr Asp Arg Gly Trp Tyr Cys Asp Asn Ala Gly Ser 335 340 345	1057
GTA TCT TTC TTC CCA CAA GCT GAA ACA TGT AAA GTT CAA TCA AAT CGA Val Ser Phe Phe Pro Gln Ala Glu Thr Cys Lys Val Gln Ser Asn Arg 350 355 360	1105

GTA TTT TGT GAC ACA ATG AAC AGT TTA ACA TTA CCA AGT GAA ATA AAT Val Phe Cys Asp Thr Met Asn Ser Leu Thr Leu Pro Ser Glu Ile Asn 365 370 375 380	1153
CTC TGC AAT GTT GAC ATA TTC AAC CCC AAA TAT GAT TGT AAA ATT ATG Leu Cys Asn Val Asp Ile Phe Asn Pro Lys Tyr Asp Cys Lys Ile Met 385 390 395	1201
ACT TCA AAA ACA GAT GTA AGC AGC TCC GTT ATC ACA TCT CTA GGA GCC Thr Ser Lys Thr Asp Val Ser Ser Ser Val Ile Thr Ser Leu Gly Ala 400 405 410	1249
ATT GTG TCA TGC TAT GGC AAA ACT AAA TGT ACA GCA TCC AAT AAA AAT Ile Val Ser Cys Tyr Gly Lys Thr Lys Cys Thr Ala Ser Asn Lys Asn 415 420 425	1297
CGT GGA ATC ATA AAG ACA TTT TCT AAC GGC TGC GAT TAT GTA TCA AAT Arg Gly Ile Ile Lys Thr Phe Ser Asn Gly Cys Asp Tyr Val Ser Asn 430 435 440	1345
AAA GGG ATG GAC ACT GTG TCT GTA GGT AAC ACA TTA TAT TAT GTA AAT Lys Gly Met Asp Thr Val Ser Val Gly Asn Thr Leu Tyr Tyr Val Asn 445 450 455 460	1393
AAG CAA GAA GGT AAA AGT CTC TAT GTA AAA GGT GAA CCA ATA ATA AAT Lys Gln Glu Gly Lys Ser Leu Tyr Val Lys Gly Glu Pro Ile Ile Asn 465 470 475	1441
TTC TAT GAC CCA TTA GTA TTC CCC TCT GAT GAA TTT GAT GCA TCA ATA Phe Tyr Asp Pro Leu Val Phe Pro Ser Asp Glu Phe Asp Ala Ser Ile 480 485 490	1489
TCT CAA GTC AAC GAG AAG ATT AAC CAG AGC CTA GCA TTT ATT CGT AAA Ser Gln Val Asn Glu Lys Ile Asn Gln Ser Leu Ala Phe Ile Arg Lys 495 500 505	1537
TCC GAT GAA TTA TTA CAT AAT GTA AAT GCT GGT AAA TCC ACC ACA AAT Ser Asp Glu Leu Leu His Asn Val Asn Ala Gly Lys Ser Thr Thr Asn 510 515 520	1585
ATC ATG ATA ACT ACT ATA ATT ATA GTG ATT ATA GTA ATA TTG TTA TCA Ile Met Ile Thr Thr Ile Ile Ile Val Ile Ile Val Ile Leu Leu Ser 525 530 535 540	1633
TTA ATT GCT GTT GGA CTG CTC TTA TAC TGT AAG GCC AGA AGC ACA CCA Leu Ile Ala Val Gly Leu Leu Leu Tyr Cys Lys Ala Arg Ser Thr Pro 545 550 555	1681
GTC ACA CTA AGC AAA GAT CAA CTG AGT GGT ATA AAT AAT ATT GCA TTT Val Thr Leu Ser Lys Asp Gln Leu Ser Gly Ile Asn Asn Ile Ala Phe 560 565 570	1729
AGT AAC TAAATAAAAA TAGCACCTAA TCATGTTCTT ACAATGGTTT ACTATCTGCT Ser Asn	1785
CATAGACAAC CCATCTGTCA TTGATTTTC TTAAAATCTG AACTTCATCG AAACCTCAT	1845
CTATAAACCA TCTCACTTAC ACTATTTAAG TAGATTCCTA GTTTATAGTT ATAT	1899

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:20:

(i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 (A) LENGTH: 574 amino acids
 (B) TYPE: amino acid
 (D) TOPOLOGY: linear

(ii) MOLECULE TYPE: protein

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:20:

```

Met Glu Leu Leu Ile Leu Lys Ala Asn Ala Ile Thr Thr Ile Leu Thr
 1           5           10
Ala Val Thr Phe Cys Phe Ala Ser Gly Gln Asn Ile Thr Glu Glu Phe
 20        25        30
Tyr Gln Ser Thr Cys Ser Ala Val Ser Lys Gly Tyr Leu Ser Ala Leu
 35        40        45
Arg Thr Gly Trp Tyr Thr Ser Val Ile Thr Ile Glu Leu Ser Asn Ile
 50        55        60
Lys Glu Asn Lys Cys Asn Gly Thr Asp Ala Lys Val Lys Leu Ile Lys
 65        70        75        80
Gln Glu Leu Asp Lys Tyr Lys Asn Ala Val Thr Glu Leu Gln Leu Leu
 85        90        95
Met Gln Ser Thr Pro Pro Thr Asn Asn Arg Ala Arg Arg Glu Leu Pro
100       105       110
Arg Phe Met Asn Tyr Thr Leu Asn Asn Ala Lys Lys Thr Asn Val Thr
115       120       125
Leu Ser Lys Lys Arg Lys Arg Arg Phe Leu Gly Phe Leu Leu Gly Val
130       135       140
Gly Ser Ala Ile Ala Ser Gly Val Ala Val Ser Lys Val Leu His Leu
145       150       155       160
Glu Gly Glu Val Asn Lys Ile Lys Ser Ala Leu Leu Ser Thr Asn Lys
165       170       175
Ala Val Val Ser Leu Ser Asn Gly Val Ser Val Leu Thr Ser Lys Val
180       185       190
Leu Asp Leu Lys Asn Tyr Ile Asp Lys Gln Leu Leu Pro Ile Val Asn
195       200       205
Lys Gln Ser Cys Ser Ile Ser Asn Ile Glu Thr Val Ile Glu Phe Gln
210       215       220
Gln Lys Asn Asn Arg Leu Leu Glu Ile Thr Arg Glu Phe Ser Val Asn
225       230       235       240
Ala Gly Val Thr Thr Pro Val Ser Thr Tyr Met Leu Thr Asn Ser Glu
245       250       255
Leu Leu Ser Leu Ile Asn Asp Met Pro Ile Thr Asn Asp Gln Lys Lys
260       265       270
Leu Met Ser Asn Asn Val Gln Ile Val Arg Gln Gln Ser Tyr Ser Ile
275       280       285

```

Met Ser Ile Ile Lys Glu Glu Val Leu Ala Tyr Val Val Gln Leu Pro
 290 295 300
 Leu Tyr Gly Val Ile Asp Thr Pro Cys Trp Lys Leu His Thr Ser Pro
 305 310 315 320
 Leu Cys Thr Thr Asn Thr Lys Glu Gly Ser Asn Ile Cys Leu Thr Arg
 325 330 335
 Thr Asp Arg Gly Trp Tyr Cys Asp Asn Ala Gly Ser Val Ser Phe Phe
 340 345 350
 Pro Gln Ala Glu Thr Cys Lys Val Gln Ser Asn Arg Val Phe Cys Asp
 355 360 365
 Thr Met Asn Ser Leu Thr Leu Pro Ser Glu Ile Asn Leu Cys Asn Val
 370 375 380
 Asp Ile Phe Asn Pro Lys Tyr Asp Cys Lys Ile Met Thr Ser Lys Thr
 385 390 395 400
 Asp Val Ser Ser Ser Val Ile Thr Ser Leu Gly Ala Ile Val Ser Cys
 405 410 415
 Tyr Gly Lys Thr Lys Cys Thr Ala Ser Asn Lys Asn Arg Gly Ile Ile
 420 425 430
 Lys Thr Phe Ser Asn Gly Cys Asp Tyr Val Ser Asn Lys Gly Met Asp
 435 440 445
 Thr Val Ser Val Gly Asn Thr Leu Tyr Tyr Val Asn Lys Gln Glu Gly
 450 455 460
 Lys Ser Leu Tyr Val Lys Gly Glu Pro Ile Ile Asn Phe Tyr Asp Pro
 465 470 475 480
 Leu Val Phe Pro Ser Asp Glu Phe Asp Ala Ser Ile Ser Gln Val Asn
 485 490 495
 Glu Lys Ile Asn Gln Ser Leu Ala Phe Ile Arg Lys Ser Asp Glu Leu
 500 505 510
 Leu His Asn Val Asn Ala Gly Lys Ser Thr Thr Asn Ile Met Ile Thr
 515 520 525
 Thr Ile Ile Ile Val Ile Ile Val Ile Leu Leu Ser Leu Ile Ala Val
 530 535 540
 Gly Leu Leu Leu Tyr Cys Lys Ala Arg Ser Thr Pro Val Thr Leu Ser
 545 550 555 560
 Lys Asp Gln Leu Ser Gly Ile Asn Asn Ile Ala Phe Ser Asn
 565 570

(2) INFORMATION FOR SEQ ID NO:21:

- (i) SEQUENCE CHARACTERISTICS:
 - (A) LENGTH: 15 amino acids
 - (B) TYPE: amino acid
 - (C) STRANDEDNESS:
 - (D) TOPOLOGY: unknown

(ii) MOLECULE TYPE: peptide

(xi) SEQUENCE DESCRIPTION: SEQ ID NO:21:

Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser Gly Gly Gly Gly Ser
1 5 10 15

【図面の簡単な説明】

【図1A】 G λ -1 s c F Vファージ結合のRSV19 mAb（国際特許出願公報第WO92/04381号、1992年3月19日公開）との競合を示すグラフである。

【図1B】 G λ -1 s c F Vファージ結合のRSV B4 mAb（国際特許出願公報第WO93/20210号、1993年10月14日公開）との競合を示すグラフである。

【図2】 s c F Vファージ、G λ -1、G λ -3およびG κ -1とRSV系統273によるウイルス中和を示すグラフである。

【図3】 G λ -1 L鎖可変領域、プロセッシングされたN末端から枠組み構造I VのDNA配列（配列番号1）および蛋白質配列（一文字コードにおいて報告されたアミノ酸）（配列番号2）を示す。

【図4】 G λ -1 H鎖可変領域、プロセッシングされたN末端から枠組み構造I VのDNA配列（配列番号3）および蛋白質配列（一文字コードにおいて報告されたアミノ酸）（配列番号4）を示す。

【図5】 G λ -1モノクローナル抗体の構築に使用されるクローニング法を示す。H鎖V領域をpCD誘導体ベクター中にXho I-Apa Iフラグメントとしてクローン化した。全L鎖V領域をpCN誘導体ベクター、43-1 p c n中にSac I-Avr IIフラグメントとしてクローン化した。詳細は上記する。

【図6】 G λ -1一本鎖F ν のH鎖アミノ酸配列（配列番号5）と本発明の種々のモノクローナル抗体との比較を提供する。A（配列番号7）およびB（配列番号8）構築物のH鎖のアミノ酸配列を示す。残基の番号は、生殖細胞系（

GL) 遺伝子Dp58 (配列番号6) に基づき、成熟のプロセッシングされたアミノ末端で開始し、CDR3で終結する。「-」は上記の配列との同一性を示す (例えば、Bと比べたA)。太字の残基はリーダー領域およびCDR1-3に相当する。

【図7】 Gλ-1A1本鎖FvのL鎖アミノ酸配列 (配列番号9) と本発明の種々のモノクローナル抗体の比較を提供する。A (配列番号11) およびB (配列番号12) 構築物のL鎖アミノ酸配列を示す。Vκ領域の残基の番号は、生殖細胞系 (GL) 遺伝子DpL8 (配列番号10) に基づき、成熟のプロセッシングされたアミノ末端で開始し、CDR3で終結する。枠組み構造4を参照するために、実際の番号付もまたGλ-1Aについて示される。図6と同様に、「-」は上記の配列との同一性を示す。


【図8】 図8A~8Fは、H鎖についてRSV中和ヒトGλ-1mAbを含有する発現プラスミドGλ-1Ap c dの連続的なDNA配列 (配列番号13) を示す。Gλ-1H鎖の翻訳開始、リーダーペプチド、アミノ末端プロセッシング部位、カルボキシ末端およびEcoRI制限エンドヌクレアーゼ切断部位を示す。

【図9】 図9A~9Eは、L鎖についてRSV中和ヒトGλ-1mAbを含有する発現プラスミドGλ-1Ap c nの連続的なDNA配列 (配列番号14) を示す。図8A-8Fと同様にL鎖について対応する特徴が示される。

【図10】 図10Aおよび10Bは、プラスミドGλ-1Bp c dのH鎖のコーディング領域の連続的なDNA配列 (配列番号15) を示す。太字の残基は、図8A-8F (配列番号13) におけるGλ-1Ap c dのための全ベクター配列との相違を示す。

【図11】 プラスミドGλ-1Bp c nのL鎖のコーディング領域のDNA配列 (配列番号16) を示す。太字の残基は、図9A-9E (配列番号14) におけるGλ-1Ap c nの全ベクター配列との相違を示す。

【図 1 A】



【図 1 B】




Fig. 1B

Fig. 2

ファージF_vを用いるRS/V/273の中和




FIGURE 3

1	CAGTCTGTGTTGACGCAGCCGCCCTCAGTCTCTGCGGCCCCAGGACAGAA	50
	Q S V L T Q P P S V S A A P G Q K	
51	GGTCACCATCTCCTGCACTGGGAGCAGCTCCAACCTCGGGGCAGGTTATG	100
	V T I S C T G S S S N L G A G Y D	
101	ATGTTCACTGGTACCGGCAACTTCCAGGGACAGCCCCAAACTCCTCATC	150
	V H W Y R Q L P G T A P K L L I	
151	TATGATAACAACAATCGGCCCTCAGGGGTCCCTGACCGATTCTCTGGCTC	200
	Y D N N N R P S G V P D R F S G S	
201	CAAGTCTGGCCCCCTCAGCCTCCCTGGCCATCTCTGGGCTCCAGGCTGAGG	250
	K S G P S A S L A I S G L Q A E D	
251	ATGAGGCTGATTATTACTGCCAGTCCTATGACAGCAGCCTGAATGGTTAT	300
	E A D Y Y C Q S Y D S S L N G Y	
301	GTCTTCGGAACTGGGACCCAGCTCACCGTCCTAGGT	336
	V F G T G T Q L T V L G	

FIGURE 4

1	GAGGTGCAGCTGGTGGAGTCTGGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGGGGGTC	50
	E V Q L V E S G G G L V Q P G G S	
51	CCTGAGACTCTCCTGCCGAGCCTCTGGAGTCTCCCTCAGTGGATAACAAGA	100
	L R L S C A A S G V S L S G Y K M	
101	TGAACTGGGTCCGCCAGGCTCCAGGGAAGGGGCTGGAATGGGTCTCTTCC	150
	N W V R Q A P G K G L E W V S S	
151	ATTACTGGTATGAGTAATTACATACACTACTCAGACTCAGTGAAGGGCCG	200
	I T G M S N Y I H Y S D S V K G R	
201	ATTCACCATCTCCAGAGACAACGCCATGAACTCACTGTATCTGCAAATGA	250
	F T I S R D N A M N S L Y L Q M N	
251	ACAGCCTGACAGCCGAGGACACGGGTGTTTATTATTGTGCGACACAACCG	300
	S L T A E D T G V Y Y C A T Q P	
301	GGGGAGCTGGCGCCTTTTGACCATTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGT	350
	G E L A P F D H W G Q G T L V T V	
351	CTCCTCA	357
	S S	

Figure 5




FIGURE 6

Gλ-1一本鎖fvとmAbの
H鎖アミノ酸配列の比較

リーダーおよび可変領域

GL Dp58:	EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFTFS
Gλ-1 scFv:	-----VSL-
Gλ-1A:	MGWSCIIILFLVATATGVHS---L-----
Gλ-1B:	-----V-----
	CDR1 CDR2

GL Dp58:	SYEMNWVRQAPGKGLEWVS YI SSSG STIYYADSVKGR FTISRDNAKNSLY
Gλ-1 scFV:	G-K -----S-TGMSNY-H-S-----M----
Gλ-1A:	-----
Gλ-1B:	-----
	CDR3

GL: Dp58:	LQMNSLRAEDTAVYYCAR
Gλ-1 scFv:	-----T-----G----- TPGELAPFDHWG QGTLVTVSS
Gλ-1A:	-----
Gλ-1B:	-----

FIG 7
Gλ-1A一本鎖FvとmAbの
L鎖アミノ酸配列の比較

リーダーおよび可変領域

	CDR1

GL DpL8:	QSVLTQPPSVSGAPGQRVTISCT GS SSNIG
Gλ-1 scFv:	-----A----K-----L-
Gλ-1A:	MGWSCIIILFLVATATGVHS E-----
Gλ-1B:	-----QSV-----
	CDR2

GL DpL8:	AGYDVHWYQQLPGTAPKLLIYGNSNRPS GVDPDRFSGSKSGTSASLAITGL
Gλ-1 scFv:	-----R-----D-N-----P-----S--
Gλ-1A:	-----
Gλ-1B:	-----
	CDR3

GL DpL8:	QAEDEADYYC
Gλ-1 scFv:	----- QSYDSSLNGYV FGTGTQLTVLG
Gλ-1A:	-----
Gλ-1B:	-----

FIGURE 8A

```

1   gacgtcgcgccgctctagggcctccaaaaagcctcctcactacttctgg
51  aatagctcagaggccgaggcgccctcggcctctgcataaataaaaaaat
101 tagtcagccatgcatggggcggagaatgggcggaactgggcggagttagg
151 ggccgggatgggcggagttagggcgggactatggttgctgactaattgag
201 atgcatgctttgcataacttctgcctgctggggagcctggggactttccac
251 acctgggttgctgactaattgagatgcatgctttgcataacttctgcctgct
301 ggggagcctggggactttccacaccctaactgacacacattccacagaat
351 taattcccggggatcgatccgctcgacgtacgactagttattaatagtaat
401 caattacgggggtcatttagttcatagcccatatatggagttccgcgttaca
451 taacttacggtaaatggcccgccctggctgaccgcccacgacccccgccc
501 attgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggactt
551 tccattgacgtcaatgggtggactatttacggtaaaactgcccacttggca
601 gtacatcaagtgtatcatatgccaaagtacgccccctattgacgtcaatga
651 cggtaaatggcccgcctggcattatgcccgagtacatgaccttatgggact
701 ttctacttggcagtacatctacgtattagtcacgctattaccatgggtg
751 atgcgggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacg
801 gggatttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtttggtttggc
851 accaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccgccccattg
901 acgcaaataggcggtaggcgtgtacgggtgggaggtctatataagcagagc

                                     EcoRI
951  tgggtacgtgaaccgtcagatcgccctggagacgccatcgaattctgagca
1001 cacaggacctcaccatgggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca
      M G W S C I I L F L V A
      リーダー 開始

                                     XhoI
1051 acagctacaggtgtccactccgaggtccaactgctcgagttctgggggagg
      T A T G V H S E V Q L L E S---
      プロセッシングされたN末端

```

FIGURE 8B

```

1101 cttggtacagcctggggggtccctgagactctcctgcgccagcctctggag
1151 tctccctcagtggtatacaagatgaactgggtccgccaggctccagggaag
1201 gggctggaatgggtctcttccattactggtatgagtaattacatacacta
1251 ctcagactcagtgaagggccgattcaccatctccagagacaacgccatga
1301 actcactgtatctgcaaataaacagcctgacagccgaggacacgggtgtt
1351 tattattgtgacacacaaccgggggagctggcgcccttttgaccattgggg

          BstEII                      Bsp120I
1401 ccagggaaccctgggtcaccgtctcctcagcctccaccaagggcccatcgg
      Q  G  T  L  V  T  V  S  S  /
          枠組み構造 IV / CH1
1451 tcttccccctggcaccctcctccaagagcacctctgggggcacagcggcc
1501 ctgggctgcctggtcaaggactacttccccgaaccggtgacggtgtcgtg
1551 gaactcaggcgccctgaccagcggcggtgcacaccttcccggctgtcctac

                                BstEII
1601 agtcctcaggactctactccctcagcagcgtgggtgaccgtgcctccagc
1651 agcttgggcacccagacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaa
1701 caccaagggtggacaagaaagttgagcccaaactcttgtagacaaaactcaca
1751 catgcccaccgtgcccagcacctgaactcctgggggggaccgtcagtccttc
1801 ctcttcccccccaaaacccaaggacaccctcatgatctcccggaccctga
1851 ggtcacatgcgtggtggtggacgtgagccacgaagaccctgaggtcaagt
1901 tcaactggtacgtggacggcggtggaggtgcataatgccaagacaaagccg
1951 cgggaggagcagtacaacagcacgtaccgggtggtcagcgtcctcacgt
2001 cctgcaccaggactggctgaatggcaaggagtacaagtgcaaggctctcca
2051 acaaagccctcccagcccccatcgagaaaaccatctccaaagccaaaggg
2101 cagccccgagaaccacaggtgtacacctgcccccatcccgggatgagct
2151 gaccaagaaccagggtcagcctgacctgcctggtcaaaggcttctatccca

```

FIGURE 8C

2201 gcgacatcgccgtggagtgaggagcaatgggcagccggagaacaactac
 2251 aagaccacgcctcccgtgctggactccgaacggctccttcttctctacag
 2301 caagctcacccgtggacaagagcaggtggcagcaggggaacgtcttctcat
 2351 gctccgtgatgcatgaggctctgcacaaccactacacgcagaagagcctc
 2401 tcctgtctccgggtaaatgatagatatctacgtatgatcagcctcgact
 S P G K * H鎖のC末端
 2451 gtgccttctagttgccagccatctgttggttgccccctcccccggtgccttc
 2501 cttgaccctggaaggtgccactcccactgtccttttctaataaaaatgagg
 2551 aaattgcacgcattgtctgagtaggtgtcattctattctggggggtggg
 2601 gtggggcaggacagcaagggggaggattgggaagacaatagcagggcatgc
 2651 tgggggatgcggtgggctctatggaaccagctggggctcgacagcgctgga
 2701 tctcccgatccccagctttgcttctcaatttcttatttgcataatgagaa
 2751 aaaaaggaaaattaattttaacaccaattcagtagttgattgagcaaatg
 2801 cgttgccaaaaaggatgcttttagagacagtggttctctgcacagataagga
 2851 caaacattattcagagggagtagccagagctgagactcctaagccagtga
 2901 gtggcacagcattctagggagaaatatgcttggtcatcacgaagcctgat
 2951 tccgtagagccacaccttggttaaggggccaatctgctcacacaggatagag
 3001 agggcaggagccagggcagagcatataaggtgaggtaggatcagttgctc
 3051 ctcacatttgcttctgacatagttgtgttgggagcttggtatagcttggac
 3101 agctcagggtcgcatcttcgcgcaaacttgacggcaatcctagcgtgaa
 3151 ggctggtaggattttatccccgctgccatcatggttcgaccattgaactg
 3201 catcgtcgccgtgtcccaaaatatggggattggcaagaacggagacctac
 3251 cctggcctccgctcaggaacgagttcaagtacttccaaagaatgaccaca
 3301 acctcttcagtgggaaggtaaacagaatctgggtgattatgggtaggaaaac
 3351 ctgggttctccattcctgagaagaatcgacctttaaggacagaattaata

FIGURE 8D

```

3401 tagttctcagtagagaactcaaagaaccaccacgaggagctcattttctt
3451 gccaaaagtttgatgatgccttaagacttattgaacaaccggaattggc
3501 aagtaaagtagacatggtttgatagtcggaggcagttctgtttaccagg
3551 aagccatgaatcaaccaggccaccttagactctttgtgacaaggatcatg
3601 caggaatttgaaagtgacacgtttttccagaaattgatttggggaaata
3651 taaacttctccagaatacccaggcgctctctctgaggccaggaggaaa
3701 aaggcatcaagtataagtttgaagtctacgagaagaaagactaacaggaa
3751 gatgctttcaagttctctgctccctcctaaagctatgcatttttataag
3801 accatgggacttttgctggcttttagatcagcctcgactgtgccttctagt
3851 tgccagccatctgttgtttgccccctccccgtgccttccttgacctgga
3901 aggtgccactcccactgtcctttcctaataaaatgaggaaattgcacgc
3951 attgtctgagtaggtgtcattctattctggggggtgggggtggggcaggac
4001 agcaagggggaggattgggaagacaatagcaggcatgctggggatgcggt
4051 gggctctatggaaccagctggggctcgatcgagtgtatgactggggccgc
4101 gatcccgctcgagagcttggcgtaatcatggtcatagctgtttcctgtgtg
4151 aaattgttatccgctcacaaattccacacaacatacagagccggaagcataa
4201 agtgtaaagcctgggggtgcctaataagtgagtgagctaactcacattaattgog
4251 ttgcgctcactgcccgttttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgca
4301 ttaatgaatcggccaaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattgggcgct
4351 cttccgcttctcgcctcactgactcgctgcgctcggtcggttcggctgogg
4401 cgagcgggtatcagctcactcaaaggcggtaatcgggttatccacagaatc
4451 aggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggcca
4501 ggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcggtttttccataggctccgcccc
4551 cctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagagggtggcgaaaccc
4601 gacaggactataaagataaccaggcggtttccccctggaagctccctcgtgc

```

FIGURE 8E

4651 gctctcctgttccgacccctgccgcttacccgataacctgtccgcctttctc
 4701 ccttcgggaagcggtggcgctttctcaatgctcacgctgtaggtatctcag
 4751 ttccggtgtaggtcggttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccg
 4801 ttccagcccgacccgctgcgccttatccggtaactatcgctcttgagtccaac
 4851 ccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggat
 4901 tagcagagcgaggatgttaggcgggtgctacagagttcttgaagtgggtggc
 4951 ctaactacggctacactagaaggacagtatcttggtatctgcgcctctgctg
 5001 aagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaca
 5051 aaccaccgctggtagcggtgggtttttttgtttgcaagcagcagattacgc
 5101 gcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatctttttctacgggggtct
 5151 gacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttgggtcatgagatt
 5201 atcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagtttta
 5251 aatcaatctaaagtatatatgagtaaacttgggtctgacagttaccaatgc
 5301 ttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatcttctggttcacccat
 5351 agttgcctgactccccgctcgtgtagataactacgataccgggagggcttac
 5401 catctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcacccgct
 5451 ccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaag
 5501 tggctcctgcaactttatccgcctccatccagtcctattaattggttgcggg
 5551 aagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgogcaacgttggttgc
 5601 attgctacaggcatcggtgtcacgctcgctggttggtatggcttcatt
 5651 cagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccattgttgt
 5701 gcaaaaaagcggttagctccttcggctcctccgacgcttgctcagaagtaag
 5751 ttggccgcagtggttatcactcatgggttatggcagcactgcataattctct
 5801 tactgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactgggtgagtactcaa

FIGURE 8F

```

5851  ccaagtcattctgagaatagtgatatgcgggcgaccgagttgctctttgcccg
5901  gcgtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgt
5951  catcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttacggc
6001  tggtgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttca
6051  gcatctttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggca
6101  aaatgccgcaaaaaagggaataagggcgacacggaaatggtgaatactca
6151  tactcttcttttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctc
6201  atgagcggatacatatgtgaatgtatttagaaaaataaacaatataggggt
6251  tcgcgcacatttccccgaaaagtgccacct

```

FIGURE 9A

```

1  gacgtcgcggccgctctaggcctccaaaaagcctcctcactacttctgg
51  aatagctcagaggccgaggcgccctcggcctctgcataaataaaaaaaat
101 tagtcagccatgcatggggcggagaatgggcggaactgggcggagttagg
151 ggcgggatgggcggagttagggcgggactatgggttgctgactaattgag
201 atgcatgctttgcataacttctgcctgctggggagcctggggactttccac
251 acctgggttgctgactaattgagatgcatgctttgcataacttctgcctgct
301 ggggagcctggggactttccacaccctaactgacacacattccacagaat
351 taattcccggggatcgatccgtcgacgtacgactagttattaatagtaat
401 caattacggggtcattagttcatagcccatatatggagttccgcgttaca
451 taacttacggtaaataggcccgccctggctgaccgccaacgacccccgccc
501 attgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggactt
551 tccattgacgtcaatgggtggactatttacggtaaactgccacttggca
601 gtacatcaagtgtatcatatgccaaagtacgccccctattgacgtcaatga
651 cggtaaataggcccgccctggcattatgccagtacatgaccttatgggact
701 ttectacttggcagtacatctacgtatttagtcatcgctattaccatgggtg
751 atgcgggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacg
801 gggatttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtttgttttggc
851 accaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccgccccattg
901 acgcaaatagggcggtaggcgtgtacgggtgggaggtctatataagcagagc

                                     EcoRI
951  tgggtacgtgaaccgtcagatcgccctggagacgccatcgaattctgagca
1001 cacaggacctcaccatgggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca
      M  G  W  S  C  I  I  L  F  L  V  A
      リーダー   開始

                                     SacI
1051 acagctacaggtgtccactccgagctcacgcagccgcctcagtcctctgc
      T  A  T  G  V  H  S  E  L  T  Q  --
                                     プロセッシングされたN末端

```

FIGURE 9B

1101 ggccccaggacagaaggtcaccatctcctgcactgggagcagctccaacc
 1151 tcggggcaggttatgatgttccactggtaccggcaacttccagggacagcc
 1201 cccaaactcctcatctatgataacaacaatcggccctcaggggtccctga
 1251 ccgattctctggtccaagtctggccctcagcctccctggccatctctg
 1301 ggctccaggctgaggatgaggctgattattactgccagtcctatgacagc
 1351 agcctgaatggttatgtcttcggaactgggacccagctcacgcgtcctaggg
 AvrII
 T Q L T V L G
 枠組み構造 IV / Cλ
 1401 tcagcccaaggctgccccctcggtcactctgttcccgccctcctctgagg
 1451 agcttcaagccaacaaggccacactgggtgtgtctcataagtgactttctac
 1501 ccgggagccgtgacagtggcctggaaggcaattagcagccccgtcaaggc
 1551 gggagtgagaccaccacaccctccaaacaaagcaacaacaagtacgcgg
 1601 ccagcagctatctgagcctgacgcctgagcagtggaagtcccacagaagg
 1651 tacagctgccagggtcacgcatgaagggagcacccgtggagaagacagtggc
 1701 ccctacagaatgttcatagtttctagatctacgtatgatcagcctcgactg
 P T E C S * C末端 L鎖
 1751 tgccttctagttgccagccatctgttggtttgccccctccccgtgccttcc
 1801 ttgaccctggaagggtgccactcccactgtccttttcctaataaaatgagga
 1851 aattgcacgcattgtctgagtaggtgtcattctattctgggggggtgggg
 1901 tggggcaggacagcaagggggaggattgggaagacaatagcaggcatgct
 1951 ggggatgcggtgggctctatggaaccagctggggctcgacagctcgagct
 2001 agctttgcttctcaatttcttatttgcataatgagaaaaaaggaaaatt
 2051 aattttaacaccaattcagtagttgattgagcaaattgcgttgccaaaaag
 2101 gatgctttagagacagtgttctctgcacagataaggacaaacattattca
 2151 gagggagtaccagagctgagactcctaagccagtgagtggcacagcatt

FIGURE 9C

2201 ctagggagaaatatgcttgtcatcaccgaagcctgattccgtagagccac
 2251 accttggttaagggccaatctgctcacacaggatagagagggcaggagcca
 2301 gggcagagcatataagggtgaggtaggatcagttgctcctcacatttgctt
 2351 ctgacatagttgtgttgggagcttggatcgatccaccatgggtgaacaag
 2401 atggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggc
 2451 tatgactgggcacacagacaatcggtgctctgatgccgcgctgttcgg
 2501 gctgtcagcgcagggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccg
 2551 gtgccctgaatgaactgcaggacgaggcagcgcggctatcgtggctggcc
 2601 acgacgggcgcttcccttgccgagctgtgctcgacgttgtcactgaagcggg
 2651 aagggaactggctgctattgggcgaagtgcgggggcaggatctcctgtcat
 2701 ctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatggg
 2751 cggctgcatacgttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaa
 2801 acatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttctgtcgc
 2851 aggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttc
 2901 gccaggctcaaggcgcgcgatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgaccca
 2951 tggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctg
 3001 gattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacata
 3051 gcgttggtacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctga
 3101 ccgcttccctcgtgctttacggtatcgcgcgtcccgattcgcagcgcacg
 3151 ccttctatcgcttcttgacgagttcttctgagcgggactctggggttcg
 3201 aaatgaccgaccaagcgacgcccacctgccatcacgagatttcgattcc
 3251 accgcgccttctatgaaagggttgggcttcggaatcgttttccgggacgc
 3301 cggctggatgatcctccagcgcggggatctcatgctggagttcttcgccc
 3351 accccaacttgtttattgcagcttataatgggttacaataaagcaatagc

FIGURE 9D

```

3401 atcacaaatttcacaaataaagcatttttttccactgcattctagttgtgg
3451 tttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggatcgcggccgcga
3501 tcccgtcgagagcttggcgtaatcatggtcataagctgtttcctgtgtgaa
3551 attgttatccgctcacaaattccacacaacatacgagccggaagcataaag
3601 tgtaaagcctgggggtgcctaataagtgagtgagctaactcacattaattgcgtt
3651 gcgctcactgcccgtttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcatt
3701 aatgaatcggccaacgcgcggggagaggcgggtttgcgtattgggcgctct
3751 tccgcttccctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcg
3801 agcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcag
3851 gggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaaggccagcaaaaaggccagg
3901 aaccgtaaaaaggccgcggttgctggcggtttttccataggctccgcccccc
3951 tgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagagggtggcgaaaccgga
4001 caggactataaagataaccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgc
4051 tctcctgttccgaccctgcgcgttacccggatacctgtccgcctttctccc
4101 ttccgggaagcgtggcgcttttctcaatgctcacgctgtaggtatctcagtt
4151 cgggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaacccccggtt
4201 cagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaaccc
4251 ggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggatta
4301 gcagagcgaggtatgtaggcgggtgctacagagttcttgaaagtgggtgcct
4351 aactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgtgaa
4401 gccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaa
4451 ccaccgctggtagcgggtggttttttgtttgcaagcagcagattacgcgc
4501 agaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatctttctacggggtctga
4551 cgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggaattttgggtcatgagattat

```

FIGURE 9E

```

4601  caaaaaggatcttcacctagatcccttttaaattaaaaatgaagttttaaa
4651  tcaatctaaagtatatatgagtaaacttggctctgacagttaccaatgctt
4701  aatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatcttctggtccatccatag
4751  ttgcttgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggaggggcttacca
4801  tctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcacccgctcc
4851  agatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtg
4901  gtcttgcaactttatccgcctccatccagtcctattaattggtgcccggaa
4951  gctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacggttggtgccat
5001  tgctacaggcatcgtgggtgtcacgctcgtcgtttgggtatggcttcattca
5051  gctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccccattgttgtgc
5101  aaaaaagcgggttagctccttcgggtcctccgatcgttgctcagaagtaagtt
5151  ggccgcagtggttatcactcatgggttatggcagcactgcataattctctta
5201  ctgtcatgccatccgtaagatgcttttctgtgactgggtgagtactcaacc
5251  aagtcattctgagaatagtggtatgcggcgaccgagttgctcttgcccggc
5301  gtcaatacgggataataccgcgccacatagcagaactttaaaagtgtctca
5351  tcattggaaaacggttcttcggggcgaaaactctcaaggatcttacccgtg
5401  ttgagatccagttcgatgtaaccactcgtgcacccaactgatcttcagc
5451  atcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaa
5501  atgccgcaaaaaagggaataaggcgacacgggaaatggtgaataactcata
5551  ctcttcctttttcaatattattgaagcatttatcagggttattgtctcat
5601  gagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaataggggttc
5651  cgcgcacatttccccgaaaagtgccacct

```

FIGURE 10A

	EcoRI <u>gaattct</u> gagca	1000
cacaggacctcacc <u>at</u> gggatggagctgtatcatcctcttcttggtagca		1050
M G W S C I I L F L V A		
acagctacaggtgtccactccgaggtgca <u>g</u> ctgg <u>g</u> tgagttctgggggagg		1100
T A T G V H S <u>E V Q</u> L <u>V</u> E S -		
N- 末端		
cttgggtacagcctgggggggtccctgagactctcctgcgcagcctctggag		1150
tctccctcagtggtatacaagatgaactgggtccgccagggtccagggaaag		1200
gggctggaatgggtctcttccattactgggtatgagtaattacatacacta		1250
ctcagactcagtggaagggccgattcaccatctccagagacaacgccatga		1300
actcactgtatctgcaaatgaacagcctgacagccgaggacacgggtgtt		1350
tattattgtgcgacacaaccgggggagctggcgcccttttgaccattgggg		1400
	Bsp120I	
ccagggaaaccctgggtcacctgtctcctcagcctccacca <u>agggcc</u> atcgg		1450
tcttccccctggcaccctcctccaagagcacctctgggggacacagcggcc		1500
ctgggctgcctgggtcaaggactacttccccgaaccgggtgacggtgtcgtg		1550
gaactcaggcgccctgaccagcggcgtgcacaccttcccggctgtcctac		1600
agtcctcaggactctactccctcagcagcgtgggtgaccgtgccctccagc		1650
agcttggggcaccacagacctacatctgcaacgtgaatcacaagcccagcaa		1700
caccaagggtggacaagaaagttgagcccaaattcttgtagacaaaactcaca		1750
catgcccaccgtgcccagcacctgaactcctggggggaccgtcagttctc		1800
ctcttccccccaaaacccaaggacaccctcatgatctcccggaccctga		1850
ggtcacatgcgtgggtgggtggacgtgagccacgaagaccctgaggtcaagt		1900
tcaactggtacgtggacggcgtggaggtgcataatgccaaagacaaagccg		1950
cgggaggagcagtacaacagcacgtaccgggtgggtcagcgtcctcacgt		2000
cctgcaccaggactgggtgaatggcaaggagtagaagtgaagggtctcca		2050

FIGURE 10B

acaaagccctcccagcccccatcgagaaaaccatctccaaagccaaaggg	2100
cagccccgagaaccacaggtgtacaccctgcccccatcccgggatgagct	2150
gaccaagaaccaggtcagcctgacctgacctgggtcaaaggcttctatccca	2200
gcgacatcgccgtggagtgggagagcaatgggcagccggagaacaactac	2250
aagaccacgcctcccgtgctggactccgacggetccttcttccctctacag	2300
caagctcaccgtggacaagagcaggtggcagcaggggaacgtcttctcat	2350
gctccgtgatgcatgaggctctgcacaaccactacacgcagaagagcctc	2400
tcctgtctccgggtaaatgatagatatct	
S P G K *	

【图 11】

	EcoRI <u>gaattctgagca</u>	1000
cacaggacctcaccatgggatggagctgtatcatcctcttcttggttagca		1050
M G W S C I I L F L V A		
acagctacaggtgtccactcc <u>cagtcctgtgtg</u> acgcagccgcctcagt		1100
T A T G V H S <u>Q S V</u> L T Q -		
	N- 末端	
ctctgccccccaggacagaaggtcaccatctctctgcactgggagcagct		1150
ccaacctcggggcaggttatgatgttcactggtaccggcaacttccaggg		1200
acagcccccaactcctcatctatgataacaacaatcggccctcaggggt		1250
ccctgaccgattctctggtccaagtctggccccctcagcctccctggcca		1300
tctctgggctccaggctgaggatgaggctgattattactgccagtcctat		1350
gacagcagcctgaatgggttatgtcttcggaactgggacccagctcacct		1400
AvrII <u>cctagg</u> tcagcccaaggctgccccctcggtcactctgttcccgcctcct		1450
ctgaggagcttcaagccaacaaggccacactggtgtgtctcataagtgac		1500
ttctaccggggagccgtgacagtggcctggaaggcaattagcagccccgt		1550
caaggcgggagtgaggaccaccacaccctccaaacaagcaacaacaagt		1600
acgcggccagcagctatctgagcctgacgcctgagcagtggaagtcccac		1650
agaaggtacagctgccaggtcacgcatgaagggagcacctgtggagaagac		1700
agtggccccctacagaatgttcat <u>ag</u> ttctagatctacgtatgatcagcct		1750
P T E C S *		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US00/13694

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) : A61K 39/395, 39/42; C12Q 1/00, 1/70; G01N 33/53 US CL : 424/130.1, 141.1, 147.1; 435/4, 5, 7.1 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S. : 424/130.1, 141.1, 147.1; 435/4, 5, 7.1 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) Please See Extra Sheet.		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X ----- Y	US 5,811,524 A (BRAMS et al) 22 September 1998, cols. 12- 20.	1, 4, 10-15 ----- 2, 3
X ----- Y	US 5,824,307 A (JOHNSON) 20 October 1998, cols. 4-6.	1, 4, 10-15 ----- 2, 3
X ----- Y	US 5,880,104 A (LI et al) 09 March 1999, cols. 6-10.	1, 4, 10-15 ----- 2, 3
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document published on or after the international filing date "L" document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "Z" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 16 AUGUST 2000		Date of mailing of the international search report 05 SEP 2000
Name and mailing address of the ISA/US Commissioner of Patents and Trademarks Box PCT Washington, D.C. 20231 Facsimile No. (703) 305-3230		Authorized officer BRETT NELSON Telephone No. (703) 368-1235

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)*

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US00/13694

B. FIELDS SEARCHED

Electronic data bases consulted (Name of data base and where practicable terms used):

WEST, DIALOG, MEDLINE

search terms: RSV, respiratory syncytial, monoclonal, antibodies, human, humanized, F protein, diagnostics, passive immunization, therapy, treatment

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 1998)*

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード [*] (参考)
C 0 7 K	16/10	C 1 2 N	1/15
C 1 2 N	1/15		1/19
	1/19		1/21
	1/21	C 1 2 P	21/08
	5/10	G 0 1 N	33/53
C 1 2 P	21/08		33/569
G 0 1 N	33/53		33/577
	33/569	C 1 2 N	15/00
	33/577		5/00
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CZ, DZ, EE, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, SL, TR, TT, TZ, UA, US, UZ, VN, YU, ZA		D L B Z N A A A
(72)発明者	レイモンド・ダブリュー・スウィート アメリカ合衆国19004ペンシルベニア州 バラ・シンウィード、エッジヒル・ロード108 番		
(72)発明者	ジェラルディーン・テイラー イギリス、アールジー20・7エヌエヌ、 パークシャー、ニューベリー、コンプトン		
Fターム(参考)	4B024 AA01 AA14 BA41 CA04 DA02 EA02 EA04 FA02 GA11 HA01 HA11 HA15 4B064 AG27 CA10 CA19 CC24 DA01 DA15 4B065 AA90X AA97Y AB01 BA02 CA25 CA45 CA46 4C085 AA14 BA57 CC07 CC08 DD23 4H045 AA11 AA30 BA10 CA01 DA76 EA31 EA53 FA74		